

FICHA TÉCNICA ATRAZINA 500 SC DIABLO



NOMBRE COMERCIAL: ATRAZINA 500 SC DIABLO

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

ATRAZINA

6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazina-2,4-

diamina..... **45.0% p/p**

(Equivalente a 500g de i.a./L a 20°C)

INGREDIENTES INERTES:

Emulsificante, antiespumante, anticongelante, espesante antiséptico,

estabilizador, agua **55.0% p/p**

FAMILIA O GRUPO QUÍMICO:

El ingredientes activos de **ATRAZINA 500 SC DIABLO**, la atrazina, pertenecen al grupo químico de las triazinas.

REGISTRO SANITARIO COFEPRIS: RSCO-HEDE-0204-258-064-45

TIPO DEFORMULACION: Suspensión concentrada

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO:

Líquido blanco, Gravedad específica (a 20°C): 1.11

MODO DE ACCIÓN DE ATRAZINA 500 SC DIABLO:

ATRAZINA 500 SC DIABLO es un herbicida que tiene como ingrediente activo a la atrazina. La atrazina actúa de forma sistémica, absorbiéndose principalmente por raíces con translocación acrópeta vía xilema y con acumulación en meristemas. La atrazina tiene una absorción considerable por hoja. También inhibe el transporte de electrones en el fotosistema II.

USOS AUTORIZADOS DE ATRAZINA 500 SC DIABLO:

ATRAZINA 500 SC DIABLO está autorizado para su aplicación en preemergencia a la maleza y al cultivo de maíz y sorgo.

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: 559183-2406, 55 9183-2407, Fax: 55 9183-2420, Lada: 800-2025-017,

E-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: <http://www.tridente.com.mx>

FICHA TÉCNICA ATRAZINA 500 SC DIABLO



CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES:

ATRAZINA 500 SC DIABLO es un herbicida formulado como suspensión concentrada. Este herbicida es absorbido por las raíces y las hojas de la maleza de hoja ancha y angosta que se indican a continuación:

CULTIVO	MALEZA		DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
	Nombre común (<i>Nombre científico</i>)			
Maíz Sorgo (SL)	Aceitilla	<i>Bidens pilosa</i>	2.0 – 4.0	Realizar una aplicación en preemergencia a la maleza y al cultivo
	Quelite	<i>Amaranthus hybridus</i>		
	Zacate cadillo	<i>Cenchrus equinatus</i>		
	Pata de gallo	<i>Eleusine indica</i>		
	Zacate de agua	<i>Echinochloa colonum</i>		
	Hierba golondrina	<i>Euphorbia hirta</i>	3.0 – 4.0	

() **Intervalo de Seguridad:** días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin Límite

PERIODO DE REINGRESO A LOS LUGARES TRATADOS:

12 horas después de la aplicación.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR ATRAZINA 500 SC DIABLO:

Antes de abrir el envase agite el producto, posteriormente gire la tapa de rosca y retire el sello de seguridad. Para preparar el producto, vacíe la dosis recomendada de ATRAZINA 500 SC DIABLO en el tanque de mezclado o del equipo, conteniendo las $\frac{3}{4}$ partes del volumen de agua requerido para lograr una buena cobertura, agite y posteriormente agregue el agua faltante. Es importante que exista suficiente agitación durante el mezclado y su aplicación para mantener uniforme la suspensión. En aspersiones terrestres con equipo convencional, utilice de 200 a 400 litros de agua por ha. Use el equipo de protección como lo indica la sección de "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO" de esta etiqueta.

Como la acción del producto depende de la humedad del suelo, es indispensable una lluvia o riego dentro de los 7 días posteriores a la aplicación.

En aplicación pre-emergente: aplique ATRAZINA 500 SC DIABLO en los días que sigue a la siembra, antes de que nazca la maleza y el cultivo. El suelo deberá estar bien mullido y húmedo. La maleza emerge, se forman las primeras hojas, se amarillean y mueren dentro de los 5 a 10 días posteriores a la aplicación.

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: 559183-2406, 55 9183-2407, Fax: 55 9183-2420, Lada: 800-2025-017,

E-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: <http://www.tridente.com.mx>

FICHA TÉCNICA ATRAZINA 500 SC DIABLO



CONTRAINDICACIONES:

En regiones con rotación de cultivos, no aplique más de 3 L/ha de **ATRAZINA 500 SC DIABLO** para evitar residuos en el suelo. Los campos tratados con **ATRAZINA 500 SC DIABLO** no deben sembrarse con cultivos susceptibles hasta transcurridos de 4 a 6 meses. Si las lluvias son abundantes, 6 meses después puede sembrarse algodón, papa, haba y trigo. No deberá sembrarse alfafa o donde se siembre cultivos asociados.

FITOTOXICIDAD

ATRAZINA 500 SC DIABLO no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si se utiliza de acuerdo a las dosis y recomendaciones de la etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD QUIMICA

No se recomienda **ATRAZINA 500 SC DIABLO** en mezclas en tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:

Use el equipo de protección personal (EPP) en buen estado, limpio y completo: mascarilla contra vapores tóxicos, mascarilla contra salpicaduras, gorra de algodón o sombrero, camisa de manga larga, pantalones largos, delantal tipo industrial resistente a productos químicos, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno. Se recomienda utilizar un overol de algodón sobre la ropa, para evitar infiltración del producto al cuerpo.

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: 559183-2406, 55 9183-2407, Fax: 55 9183-2420, Lada: 800-2025-017,

E-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: <http://www.tridente.com.mx>