

FICHA TÉCNICA DINASTIA MAX



NOMBRE COMERCIAL: DINASTIA MAX

COMPOSICION PORCENTUAL

FIPRONIL:

5-amino-1-(2,6-dicloro- α,α,α -trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometilsulfinilpirazol-3-carbonitrilo . **8.30% p/p**
(Equivalente a 100 g de i.a./L a 20 °C)

IMIDACLOPRID:

(E)-1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilideneamina..... **29.00% p/p**
(Equivalente a 350 g. de i.a. /L a 20 °C)

INGREDIENTES INERTES:

Dispersantes, Anticongelante, Humectante, Portador, Estabilizador, Antiespumante,
Espesante y Diluyente..... **62.70% p/p**

FAMILIA O GRUPO QUIMICO:

Fipronil: Fenilpirazoles; **Imidacloprid:** Neonicotinoides.

REGISTRO SANITARIO COFPRIS: RSCO-MEZC-INAC-1150-X035-064-37.3

TIPO DEFORMULACION: Suspensión concentrada

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO:

Densidad: 1.1680g/mL; pH: 6-8

MODO DE ACCION DE DINASTIA MAX:

DINASTIA MAX combina la acción sistémica, traslaminar, de contacto y estomacal del **IMIDACLOPRID** con la acción de contacto, ingestión, sistémico y residual del **FIPRONIL**; presentando una excelente actividad biológica sobre los insectos que se recomiendan en la etiqueta de **DINASTIA MAX**

USOS AUTORIZADOS DE DINASTIA MAX:

DINASTIA MAX está autorizado para su aplicación foliar en los cultivos de ajo, cebolla, poro, berenjena, chile, jitomate, pimiento morrón, tomate de verde y papa.

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacan, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: <http://www.tridente.com.mx>

FICHA TÉCNICA DINASTIA MAX



CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES:

DINASTIA MAX se recomienda para su uso en el combate y control de las plagas que se citan en los siguientes cultivos:

CULTIVOS	PLAGA	DOSIS L/Ha	RECOMENDACIONES
Ajo (21) Cebolla (21) Poro (21)	Trips (<i>Thrips tabaci</i>)	1.0-1.25	Realizar una aplicación foliar cuando se detecte la presencia de la plaga en el cultivo; volumen de aplicación 350-450 L/ha.
Berenjena (3) Chile (3) Jitomate (3) Papa (3)	Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	1.0-1.25	Realizar una aplicación foliar cuando se detecte la presencia de la plaga en el cultivo; volumen de aplicación 300-400 L/ha.
Pimiento morrón (3) Tomate verde (3)	Pulgón verde (<i>Myzus persicae</i>)	0.75-1.25	Realizar una aplicación foliar cuando se detecte la presencia de la plaga en el cultivo; volumen de aplicación 300-400 L/ha.

() INTERVALO DE SEGURIDAD: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

PERIODO DE REINGRESO A LOS LUGARES TRATADOS:

24 horas después de la última aplicación.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR DINASTIA MAX:

Durante el manejo y aplicación de este producto siempre utilice su equipo de protección personal limpio y completo.

Agite vigorosamente el envase antes de usar el producto. Desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción).

Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el follaje del cultivo a proteger. Llene el tanque de aplicación hasta

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacan, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: <http://www.tridente.com.mx>

FICHA TÉCNICA DINASTIA MAX



la mitad de su capacidad con agua. Mida la cantidad de producto a utilizar con una probeta graduada. Agregar el producto a la dosis recomendada, efectuar el triple lavado del envase y agregar el agua de los lavados al tanque, completar hasta su capacidad total con agua manteniendo en constante agitación, mezcle con un trozo de madera o algún otro material (nunca con las manos). La mezcla deberá ser aplicada el mismo día de su preparación y evite utilizarlo de un día para otro.

Se sugiere hacer las aplicaciones temprano en la mañana o por la tarde, cuando la temperatura y la radiación solar no sean altas a fin de evitar fitotoxicidad y/o daños por quemadura al cultivo. Aplicar a favor del viento.

Equipos de aplicación terrestre: Equipo terrestre de mochila manual o motorizada. Debe asegurarse un buen cubrimiento de las áreas infestadas.

CONTRAINDICACIONES:

No aplicar si existe alta probabilidad de lluvia próxima a fin de evitar la pérdida del producto por lavado. No aplicar si la velocidad del viento es mayor 10 km/hr, ni cuando las abejas y otros polinizadores estén en el cultivo.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:

Use el equipo de protección personal (EPP) limpio y completo: mascarilla contra vapores tóxicos, mascarilla contra salpicaduras, gorra de algodón o sombrero, camisa de manga larga, pantalones largos, delantal tipo industrial resistente a productos químicos, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno. Se recomienda utilizar un overol de algodón sobre la ropa, para evitar infiltración del producto al cuerpo.

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacan, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: <http://www.tridente.com.mx>