

FICHA TÉCNICA COTRI FLOW



NOMBRE COMERCIAL: COTRI FLOW

FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Sales Inorgánicas de Cobre

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

Ingrediente activo	% p/p
OXICLORURO DE COBRE: (Equivalente a 175 g de I.A./L)	22.73
INGREDIENTES INERTES: Diluyente, humectante, preservativo y dispersante	77.27
Total	100.0

Número de Registro Sanitario: RSCO-FUNG-0328-326-008-023

TIPO DE FORMULACIÓN: Fungicida / Suspensión acuosa

USOS AUTORIZADOS:

CULTIVOS	ENFERMEDADES		DOSIS (Lt/ha)	OBSERVACIONES
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO		
AGUACATE	Antracnosis o roña	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	300 a 400 ml. en 100lt agua	Inicie aplicaciones al inicio de la brotación repita a las cuatro semanas con un máximo de cuatro aplicaciones
PEPINO CALABAZA MELÓN SANDIA	Cenicilla vellosa Antracnosis Alternaria Pudrición bacteriana	<i>(Pseudoperonospora cubensis)</i> <i>(Colletotrichum lagenarium)</i> <i>(Alternaria uccumerina)</i> <i>(Erwinia sp)</i>	2.5 a 3.0	Iniciar aplicaciones cuando las plantas empiecen a guiar y repetir cada 7-10 días una aplicación al suelo después de sembrar, pero antes de que emerjan plantas puede ayudar a reducir infecciones de mancha angular.
CHILE	Antracnosis Cercospora Tizón temprano Mancha	<i>(Colletotrichum capcisi)</i> <i>(Cercospora capcisi)</i> <i>(Alternaria)</i>	2.5	Se pueden iniciar aplicaciones en almácigo y el campo al aparecer los primeros síntomas y repetir cada 7-10 días.

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

Inglaterra 37, Col. Parque San Andrés, Coyoacán, C.P. 04040, CDMX

Teléfono conmutador: 559183-2400, Ventas: 559183-2406

Fax: 559183-2420, Lada: 800-2025-017, E-mail: mktridente@tridente.com.mx

<http://www.tridente.com.mx>

FICHA TÉCNICA COTRI FLOW



	bacteriana	<i>solani</i> (<i>Xanthomonas vesicatoria</i>)		
FRIJOL	Antracnosis Cenicilla vellosa Mancha angular Tizón bacteriano	(<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>) (<i>Shaperoteca humulii</i>) (<i>Isariopsis griseola</i>) (<i>Xanthomonas vesicatoria</i>)	1.5-2.0	Iniciar aplicaciones cuando las plantas tengan 6 cm. de altura y repetir a intervalos de 7 días.
CÍTRICOS	Melanosis Roña Mancha grasienta	(<i>Diaporthe citri</i>) (<i>Elsinoe fawcetti</i>) (<i>Mycosphaerella spp</i>)	300 a 400 ml. en 100lt agua (5 lt/hA max)	Para la melanosis aplicar de 1 a 3 semanas después de la caída de los pétalos. Para Roña se hacen dos aplicaciones, la primera antes de floración y la segunda antes de la caída de los pétalos.
JITOMATE	Mancha gris Antracnosis Tizón temprano Mancha bacteriana	(<i>Stemphylium sp</i>) (<i>Colletotrichum ipercial</i>) (<i>Alternaria solani</i>) (<i>Xantomona vesicatoria</i>)	3.0 a 4.0	Se pueden iniciar aplicaciones en almácigo y el campo al aparecer los primeros síntomas y repetir cada 7-10 días.
MANZANO DURAZNO	Pudrición café Tiro de munición Enrollamiento de la hoja	(<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) (<i>Cladosporium cardophyllum</i>) (<i>Taphrina deformans</i>)	300 a 400 ml. en 100lt agua	La primera aplicación puede ser hecha antes del rompimiento de las yemas. Para control de la munición y enrollamiento de la hoja en arboles daramantos se puede aplicar en noviembre o diciembre antes de que emerjan.
PAPA	Tizón temprano Tizón tardío	(<i>Alternaria solani</i>) (<i>Phytophthora infestans</i>)	3.0 a 4.0	Iniciar aplicaciones desde que las plantas tengan 20-30 cms. de altura y repetir con intervalos de 7-10 días.
ZANAHORIA	Cenicilla vellosa Tizón	(<i>Peronospora sp</i>) (<i>Alternaria sp</i>) (<i>Cercospora</i>)	2.5 a 3.0	Iniciar aplicaciones cuando aparezcan los primeros síntomas y repetir con

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

Inglaterra 37, Col. Parque San Andrés, Coyoacán, C.P. 04040, CDMX

Teléfono conmutador: 559183-2400, Ventas: 559183-2406

Fax: 559183-2420, Lada: 800-2025-017, E-mail: mktridente@tridente.com.mx

<http://www.tridente.com.mx>

FICHA TÉCNICA COTRI FLOW



	temprano Mancha foliar	<i>carotae</i>		intervalos de 7-10 días.
VID	Antracnosis Mildiu velloso	<i>(Elsinoe ampelina)</i> <i>(Plasmopara viticola)</i>	600 ml. en 100lt agua 2.0 a 3.0	Efectuar la primera aplicación cuando los nuevos brotes empiecen a aparecer y repetir cada dos semanas.
CEBOLLA	Mildiu velloso Mancha púrpura	<i>(Peronospora destructor)</i> <i>(Alternaria porri)</i>	2.5 a 3.0	Iniciar el tratamiento cuando la planta tenga de 10-15 cm. y repetir cada 7 días.
FRESA	Mancha foliar	<i>(Alternaria spp.)</i>	300 a 500 ml. en 100lt agua	Aplicar antes de la floración y después de la floración.
CACAHUATE	Mancha o peca de la hoja	<i>(Cercospora personata)</i>	2.0 a 3.0	Aplicar a los primeros síntomas y repetir con intervalos de 10-12 días.
OKRA	Alternaria Antracnosis	<i>(Alternaria sp)</i> <i>(Colletotrichum sp)</i>	2.5 a 3.0	Los primeros tratamientos pueden ser en la cama de la siembra o en el campo antes de que la enfermedad aparezca y repetir a intervalos de 7-10 días.

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

Inglaterra 37, Col. Parque San Andrés, Coyoacán, C.P. 04040, CDMX

Teléfono conmutador: 559183-2400, Ventas: 559183-2406

Fax: 559183-2420, Lada: 800-2025-017, E-mail: mktridente@tridente.com.mx

<http://www.tridente.com.mx>

FICHA TÉCNICA COTRI FLOW



Tiempo de reentrada a campos tratados: 12 horas

PRODUCTO EXENTO DE TOLERANCIA DE RESIDUOS E INTERVALO DE SEGURIDAD SIN LIMITE

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Con el equipo de protección puesto, abra cuidadosamente el envase. En un tambo de 200 Lt agregue agua hasta la mitad de su capacidad. Vierta lentamente en el tambo la cantidad necesaria del producto, agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar, llene el tambo con el agua necesaria. Aplique de inmediato. Cada vez que llene el aspersor, deberá agitar la mezcla preparada. **COTRI FLOW** es un fungicida preventivo, para obtener mejores resultados, debe aplicarse antes de que aparezcan los primeros síntomas, o bien, cuándo las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo y diseminación de las enfermedades. Aplíquese con el volumen de agua necesaria para lograr una buena cobertura del follaje. Úsese las dosis mayores en cultivo en pleno desarrollo o con abundante follaje.

CONTRAINDICACIONES:

No aplicar **COTRI FLOW** cuando amenace la lluvia o esté presente, dado que su acción desprende el producto de la superficie del follaje. No se aplique en Durazno y Manzano después de la ruptura de yema.

INCOMPATIBILIDAD:

COTRI FLOW no se recomienda hacer mezclas con productos de naturaleza alcalina. Cuando se desee hacer una mezcla, deberá hacerse una prueba previa a fin de comprobar la compatibilidad. La mezcla con otros productos deberá hacerse con aquellos que se encuentren registrados y autorizados en los cultivos aquí recomendados.

FITOTOXICIDAD:

COTRI FLOW no es fitotóxico a los cultivos indicados y bajo las dosis recomendados.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

Inglaterra 37, Col. Parque San Andrés, Coyoacán, C.P. 04040, CDMX

Teléfono conmutador: 559183-2400, Ventas: 559183-2406

Fax: 559183-2420, Lada: 800-2025-017, E-mail: mktridente@tridente.com.mx

<http://www.tridente.com.mx>