

FICHA TÉCNICA DIABLOPAX



NOMBRE COMERCIAL: DIABLOPAX

FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Mezcla de los grupos triazina y alquilclorofenoxi.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P):

2,4-D isobutil ester: éster isobútilico del ácido 2,4-Diclorofenoxi acético **16.4%**

(Equivalente a 130.5 g de I.A. / L a 20°C)

Ametrina: N2-etil-N4-isopropil-6-metiltio-1,3,5-triazina-2,4-diamina **25.5%**

(Equivalente a 255 g de I.A./L a 20°C)

Solvente **58.1%**

REG: RSCO-MEZC-HEDE-1206-X0007-009-41.9

TIPO DE FORMULACIÓN: Herbicida / Concentrado Emulsionable

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO:

Concentrado Emulsionable;
densidad relativa 1.023 g/mL (20 °C)

MODO DE ACCIÓN:

Es un herbicida en presentación de concentrado emulsionable a base de dos ingredientes activos altamente eficaces:

Ametrina es un herbicida sistémico y selectivo para la caña de azúcar que es absorbido por las raíces de las malezas, siendo transportado vía xilema hasta las hojas, en donde interfiere en la acción fotosintética;

2,4-D isobutil ester, el cual tiene un modo de acción selectiva, sistémica y hormonal, el cual es absorbido por hojas y raíces, interfiriendo en el metabolismo de los ácidos nucleicos e inhibiendo el crecimiento.

USOS AUTORIZADOS:

Es un herbicida de aplicación foliar de uso agrícola, se recomienda su uso en el cultivo de caña de azúcar.

Agroquímica Tridente S.A. de C.V., Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México, Ciudad de México. Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx Pagina web: <http://www.tridente.com.mx>

FICHA TÉCNICA DIABLOPAX



ENFERMEDADES Y DOSIS:

Cultivo	Plaga	Dosis
Caña de azúcar (SL)	Zacate amargo (<i>Paspalum dilatatum</i>)	4.0-6.0 mL/ha
	Fresadilla (<i>Digitaria sanguinalis</i>)	
	Correhuela (<i>Ipomoea pupurea</i>)	
	Gordolobo (<i>Gnaphalium oxyphylum</i>)	6.0 mL/ha
	Hierba golondrina (<i>Euphorbia hirta</i>)	
	Amargosa (<i>Pharthenium hysterophorus</i>)	

()Tiempo de seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL= Sin Límite de tiempo

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: No entre al área tratada antes de 12 horas.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Para abrir el envase utilice el equipo de protección personal adecuado (gorra, overol de algodón, mascarilla, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno). Desenrosque la tapa y retire el sello de seguridad exterior. Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación directa del producto.

Calibre su equipo de aplicación. Para preparar el producto, mida la cantidad de **DIABLOPAX** de acuerdo a las dosis aquí recomendadas. Mezcle en el tanque aspersor con la mitad de agua recomendada, luego agregue el resto de agua y agite la mezcla constantemente. Realizar una aplicación foliar; en aplicación terrestre con aspersor manual o de tractor el volumen de aplicación es de 200-400 L agua/Ha.

CONTRAINDICACIONES: Se recomienda hacer la aplicación en las primeras horas de la mañana. No se aplique en las horas de calor intenso. No aplicar con vientos mayores a 10 Km/h para evitar la deriva hacia otros cultivos. No aplicarse cuando el cultivo de caña se encuentre asociado a otros como chile, tomate o frijol, ya que es fitotóxico para estos.

INCOMPATIBILIDAD: No se recomienda mezclar este producto con otros agroquímicos.

Agroquímica Tridente S.A. de C.V., Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México, Ciudad de México. Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx Pagina web: <http://www.tridente.com.mx>