

FICHA TÉCNICA HORTA 25 TRIDENTE



NOMBRE COMERCIAL: HORTA 25 TRIDENTE

FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Organofosforado

COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P): **Diazinon:** 0,0 Dietil 0-(2-isopropil-4-metil-6-pirimidinil) fosforotioato **25.00 %**

(Equivalente a 230 g de I.A./L)

Diluyente, emulsificantes y compuestos relacionados, no más de **75.00 %**

REG: RSCO-INAC-0120-007-009-025

TIPO DE FORMULACIÓN: Insecticida y/o Acaricida/Concentrado emulsionable.

CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS DEL PRODUCTO: Líquido oleoso ambarino, con olor a mercaptano; densidad relativa: 0.9311 g/mL.

MODO DE ACCIÓN: Es un insecticida que pertenece al grupo de los organofosforados su modo acción es de contacto y estomacal. El ingrediente activo de DIAZINON penetra de forma inmediata en el exoesqueleto de las plagas e internamente actúa a nivel de sistema nervioso central inhibiendo la colinesterasa provocando la interrupción del impulso eléctrico y provocando la parálisis de los insectos u otro artrópodo.

USOS AUTORIZADOS: Para aplicación al follaje en los cultivos de alfalfa, cacahuate, calabaza, cebolla, chícharo, chile, ciruelo, durazno, fresa, jitomate, manzano, melón, pepino, sandía y soya.

FICHA TÉCNICA HORTA 25 TRIDENTE



PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES:

CULTIVO	PLAGAS [NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO)]	DOSIS L/HA
Alfalfa (0)	Pulgón manchado (<i>Terioaphis maculata</i>); Pulgón del chícharo (<i>Acyrtosiphon pisum</i>); Chicharrita (<i>Aceratagallia curvata</i>)	1.0-1.5
Fresa (5)	Araña ciclamina (<i>Steneotarsonemus pallidus</i>); Pulgón (<i>Pentatrichopus spp</i>); Mosquita blanca (<i>Trialeurodes spp</i>)	4.0-5.0
Frijol (7)	Picudo del ejote (<i>Apion godmani</i>); Mosquita blanca de los invernaderos (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>); Diabrotica (<i>Diabrotica spp</i>); Minador de la hoja (<i>Liriomyza spp</i>); Chicharrita (<i>Empoasca spp</i>); Trips (<i>Caliothrips phaseoli</i>)	1.0-1.5
Cacahuete (28)	Chicharrita (<i>Empoasca spp</i>); Doradilla (<i>Diabrotica spp</i>); Trips (<i>Frankliniella spp</i>)	
Soya (7)	Chicharrita (<i>Empoasca spp</i>); Chinche ligus (<i>Ligus spp</i>); Chinche verde (<i>Nezara viridula</i>); Trips negro (<i>Caliothrips phaseoli</i>)	1.0-1.5
Melón (3)	Diabrotica (<i>Diabrotica spp</i>); Minador de la hoja (<i>Liriomyza spp</i>);	
Sandía (3)	Mosquita blanca de los invernaderos (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>);	
Calabaza (7)	Chicharrita (<i>Empoasca spp</i>); Pulgón del algodón y melón (<i>Aphis gossypii</i>); Pulga saltona negra (<i>Epitrix spp</i>)	
Pepino (3)		
Cebolla (10)	Trips (<i>Thrips tabaci</i>); Minador de la hoja (<i>Liriomyza spp</i>); Gusano de la cebolla (<i>Hylemia antiqua</i>); Chinche ligus (<i>Ligus spp</i>)	
Jitomate (1)	Minador serpentina (<i>Liriomyza munda</i>); Mosquita blanca de los invernaderos (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>); Pulga saltona (<i>Epitrix spp</i>); Doradilla (<i>Diabrotica spp</i>); Pulga negra (<i>Halticus spp</i>); Chicharrita del betabel (<i>Eutettix tenellus</i>); Trips (<i>Frankliniella spp</i>)	
Chile (5)	Pulga saltona (<i>Epitrix spp</i>); Mosquita blanca de los invernaderos (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>); Minador de la hoja (<i>Liriomyza spp</i>)	
Chícharo (21)	Trips (<i>Frankliniella spp</i>); Minador serpentina de la hoja (<i>Liriomyza pusilla</i>); Pulgón del chícharo (<i>Acyrtosiphon pisum</i>); Araña roja (<i>Tetranychus spp</i>)	
Ciruelo (20)	Escama de San José (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>); Frailecillo (<i>Macrodactylus spp</i>)	150-200 ml en 100 L de agua
Manzano (14)	Pulgón lanífero (<i>Eriosoma lanigerum</i>); Escama de San José (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>); Pulgón verde (<i>Aphis pomi</i>);	
Durazno (21)	Escama de San José (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)	

Nota: La cifra dentro del paréntesis indica el intervalo de seguridad en días, el cual debe de transcurrir entre la última aplicación y el inicio de la cosecha.

FICHA TÉCNICA HORTA 25 TRIDENTE



FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación directa del producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Mezclar la dosis de HORTA 25 TRIDENTE en la cantidad necesaria de agua limpia, para cubrir una hectárea. Para aplicaciones en pequeñas superficies o en frutales, diluir 150 ml en 100 L de agua y bañar con esta emulsión el follaje de las plantas atacadas. Se puede repetir la aplicación con intervalos de 5 a 7 días hasta un control total de la infestación.

CONTRAINDICACIONES: Hacer las aplicaciones cuando no soplen vientos fuertes y asegurar que no haya una contaminación de cultivos vecinos.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Usar mascarilla, gorra y overol de algodón, botas y guantes de neopreno, lentes de seguridad.

