# CARIOCA 3P

Clorpirifos

| | | |
|---|---|---|
| Insecticida | Polvo | Organofosforado |

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO
RSCO-INAC-0115-X0296-01-3.0

TITULAR DE REGISTRO
AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

| COMPOSICIÓN PORCENTUAL | % (p/p) |
|---|---|
| **Ingrediente Activo.** | |
| CLORPIRIFOS.<br>O,O-dietil O-3,5,6-tricloro-2-piridil fosforotioato.<br>Equivalente a 30 g de I.A/Kg | 3.00 |
| **Ingredientes Inertes.** | |
| Solvente, portador y dispersante. | 97.00 |
| TOTAL | 100.00 |

**MODO DE ACCIÓN.**
**CARIOCA 3P,** es un producto formulado como polvo a base de CLORPIRIFOS, que actúa como Insecticida no sistémico de contacto e ingestión, además de ser inhibidor de la acetilcolinesterasa.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo: gorra de algodón o sombrero, camisa de manga larga, pantalones largos, delantal tipo industrial resistente a productos químicos, lentes de seguridad, mascarilla con filtros para polvos, guantes y botas de neopreno que se destinen exclusivamente para el manejo y aplicación de plaguicidas. Se recomienda utilizar un overol de algodón sobre la ropa, para evitar infiltración de producto al cuerpo. Antes de terminar las labores descontamine el equipo de aplicación y quítese el equipo de protección en el área del trabajo, seguidamente quítese el overol y colóquelo en un lugar ventilado. Báñese y póngase ropa limpia. La ropa y overol utilizados durante la aplicación deben lavarse por separado con agua y jabón. Una vez seca, almacenar la ropa y todo el equipo de seguridad limpio en el lugar de trabajo.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

| Cultivo | Plaga<br>Nombre común<br>*(Nombre científico)* | Dosis | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Arroz<br>Avena<br>Cebada<br>Centeno<br>Maíz<br>Sorgo<br>Trigo<br>(21) | **Pulgón amarillo**<br>*(Melanaphis sacchari)* | 15-20<br>Kg/ha | Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, cuando se detecte la presencia de la plaga. |
| Trigo<br>Sorgo<br>Maíz<br>Cebada<br>Avena<br>Arroz<br>(21) | **Pulgón verde**<br>*(Schizaphis graminum)* | 15-20<br>Kg/ha | Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 14 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga. |
| Pastizales establecidos en potreros.<br>(21) | **Langosta**<br>*(Schistocerca piceifrons)* | 25-45<br>kg/ha | Realizar 2 aplicaciones en cobertura total a intervalo de 7 días, cuando se detecte la presencia de la plaga. |

( ) **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la ultima aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA.

24 horas.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

**Forma de abrir el producto:** Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo: gorra de algodón o sombrero, camisa de manga larga, pantalones largos, delantal tipo industrial resistentes a productos químicos, lentes de seguridad, mascarilla con filtros para polvos, guantes y botas de neopreno que se destinen exclusivamente para el manejo y aplicación de plaguicidas. Se recomienda utilizar un overol de algodón sobre la ropa, para evitar contacto directo del producto al cuerpo. Corte cuidadosamente con tijeras la parte superior del sobre o costal, realice esta operación con cuidado para evitar el contacto e inhalación del producto.

**Preparación:** Con ayuda de un recipiente pese el producto necesario a utilizar de acuerdo al cultivo y dosis recomendadas. Seguidamente vierta el producto pesado en la mochila de aspersión para polvos, no agite ni meta las manos. Cierre la mochila de aspersión y no destape la boquilla del equipo de aspersión con la boca.

CONTRAINDICACIONES.

No aplicar el producto cuando exista amenaza de lluvia o este lloviendo ya que puede existir lavado de producto. No aplique cuando la velocidad del viento sea alta (mayor a 15 Km/h). No se aplique en horas de calor intenso.

INCOMPATIBILIDAD.

**CARIOCA 3P,** no deberá mezclarse con otros plaguicidas.

MANEJO DE RESISTENCIA.

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".

**AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.,** GARANTIZA LA COMPOSICION CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.

ATOX
01 800 000 ATOX (2869)

En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones **(ATOX)**, atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.