DIABLOQUAT 25

Paraquat

Herbicida	Suspensión Acuosa	Bipiridilo

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO
RSCO-HEDE-0244-0500-008-25

TITULAR DE REGISTRO
AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% (p/p)
Ingrediente Activo.	
PARAQUAT 1,1'-dimetil-4,4' bipiridinio dicloruro Con un contenido del ion bipiridino no menor de 72.4% (Equivalente a 200 g de I.A./L a 20°C)	25.00
Ingredientes Inertes.	
Diluyente (agua), humectante, surfactante y colorante	75.00
TOTAL	100.00

MODO DE ACCIÓN.
DIABLOQUAT 25 es un herbicida agrícola desecante de contacto no selectivo y post-emergente a base de paraquat en solución acuosa, controla malezas de hoja angosta y ancha, anuales o perennes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

- Usar mascarilla, gorra y overol de algodón, botas y guantes de neopreno, lentes de seguridad.
- Descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación.
- Lavar con detergente y una solución alcalina como lejía.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (L/ha)
Aguacatero Cafeto, Limonero, Lima, Mandarino, Naranjo, Papayo, Toronjo, Durazno, Guayabo, Manzano, Nogal, Peral, Plátano.	*(Ambrosia sp)*; Bledo o quelite *(Amaranthus hybridus)*; Lengua de vaca *(Rumex crispus)*; Mostaza negra *(Brassica nigra)*; Tacote *(Tithonia tubaeiformis)*; Toloache *(Datura stramonium)*; Cadillo *(Xanthium strumarium)*; Verdolaga *(Portulaca oleracea)*; Avena loca *(Avena fatua)*; Pata de gallo *(Eleusine indica)*; Quelite cenizo *(Chenopodium album)*; Verdolaga *(Portulaca oleracea)*; Zacate azul *(Poa annua)*; Zacate bermuda *(Cynodon dactiyon)*; Zacate cadillo *(Cenchrus echinatus)*; Zacate fresadilla *(Digitariasanguinalis)*; Zacate de agua *(Echinochloa sp)*; Zacate Johnson *(Sorghum halepense).*	1.75 – 3.0
Alfalfa, Algodonero, Avena, Brócoli, Calabacita, Caña de azúcar, Cártamo, Cebada, Cebolla, Chícharo, Col, Coliflor, Frijol, Girasol, Jitomate, Lechuga, Maíz, Melón, Pepino, Piña, Sandía, Sorgo, Soya, Trigo, Zanahoria		1.75 – 2.0
Papa	Uso como desecante	1.75 – 3.0
Esparrago	Acahual *(Simsia amplexicauilis);* Acahualillo *(Bidens pilosa);* Amargosa *(Ambrosia sp);* Bledo o quelite *(Amaranthus hybridus);* Quelite cenizo *(Chenopodium album);* Lengua de vaca *(Rumex crispus);* Mostaza negra *(Brassica nigra);* Tacote *(Tithonia tubaeiformis);* Toloache *(Datura stramonium);* Cadillo *(Xanthium strumarium);* Verdolaga *(Portulaca oleracea);* Avena loca *(Avena fatua);* Malva *(Malva parviflora);* Pata de gallo *(Eleusine indica);* Zacate azul *(Poa annua);* Zacate bermuda *(Cynodon dactiyon)* Zacate cadillo *(Cenchrus echinatus);* Zacate fresadilla *(Digitariasanguinalis);* Zacate de agua *(Echinochloasp);* Zacate Johnson *(Sorghum halepense).*	1.75 – 2.0

Intervalo de seguridad en los cultivos aquí señalados entre la última aplicación y la cosecha, indicado en días, sin límite.

TIEMPO DE REENTRADA.
12 horas después de su aplicación.

RECOMENDACÓN: Realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza y al cultivo, en volumen de aplicación es de 600 a 800 L de agua por hectárea.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.
Agite bien el envase antes de abrirlo. Teniendo puesto el equipo de seguridad indicado, desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior (cuando el envase presente este sello), retirar totalmente la tapa y eliminar el sello de seguridad interior (sello de introducción), esto se puede realizar con la pestaña de la rosca, colocando la rosca sobre el sello con la parte lisa que tiene una pequeña pestaña en la orilla, girar y retirar después de haber roto dicho sello. Realizar esta operación con cuidado para evitar salpicaduras, contacto o inhalación del producto. Mezclar la dosis de DIABLOQUAT 25 en la cantidad necesaria de agua limpia, considerando el área a cubrir. La cantidad de DIABLOQUAT 25 y de agua variará de acuerdo a la altura y cantidad de follaje

de la maleza. La aplicación debe ser dirigida y evitar que se desvíe la aspersión por arrastre de viento u otras causas. Es un producto NO SELECTIVO por lo que se debe aplicar con equipo adecuado con campanas, o bien, dirigida la aspersión sobre la maleza sin tocar el cultivo.

CONTRAINDICACIONES.
Evite que la aspersión se desvíe a los cultivos, **DIABLOQUAT 25** destruye todos los tejidos verdes. No aplique cuando los vientos sean capaces de arrastrar la niebla del producto, o sea, con un viento arriba de 6 km/hora y haya cultivos susceptibles a menos de 1 km de distancia.

INCOMPATIBILIDAD.
No mezclar con otros productos.

MANEJO DE RESISTENCIA.
"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICION CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.

En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones **(ATOX)**, atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.