



Ficha

Técnica

HERBICIDAS



DIABLOQUAT MAX

diuron + paraquat (uso restringido)

Herbicida

Suspensión Concentrada

Diuron urea sustituida / Paraquat
Bipiridio

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO
RSCO-MEZC-1229-0609-064-65.77

TITULAR DE REGISTRO
AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

Ingrediente Activo.

PARAQUAT (USO RESTRINGIDO):

1,1'-Dimetil-4,4'-bipiridilo Con un contenido del ion bipiridilo no menor del 72.4%
(Equivalente a 200 g/L de ion bipiridilo ó 280.40 g/L de Dicloruro de paraquat)

56.57

DIURON:

3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea
(Equivalente a 100 g/L)

9.2

Ingredientes Inertes.

Diluyentes, antiespumante, dispersante, humectante y espesante

34.23

TOTAL

100.00

MODO DE ACCIÓN.

DIABLOQUAT MAX es un herbicida de contacto no selectivo que mata rápidamente la maleza y no tiene efecto residual en el suelo. Puede ser aplicado en cualquier época del año para el control de la maleza. Se recomienda usar la dosis alta para tratar la maleza densa o como primer tratamiento. Usar la dosis baja para las aplicaciones en sitios muy sombreados o para tratar los rebrotes. De preferencia aplicar cuando la maleza sea joven y tenga menos de 15 cm de altura. Este producto causara daños si se asperja sobre las plantas cultivadas. En los cultivos arbóreos o arbustivos establecidos se debe cuidar de no aplicar en la corteza inmadura del tronco los tallos. Evite aplicar cerca de cultivos susceptibles.

REG_FT_042

Versión. V00

Fecha de elaboración. 30.OCT.2024

Página 1 de 2



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha Técnica

HERBICIDAS



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Durante el manejo de este producto use el equipo de protección adecuado: gorra de algodón o sombrero, mascarilla, overol de algodón, guantes y botas. Llene el recipiente del equipo de aplicación siempre a favor del viento y con el equipo de protección puesto; del mismo modo haga las aplicaciones. Mezclar con un agitador de madera u otro material apropiado. No trate de destapar las boquillas con la boca. Después de la jornada de trabajo lave el equipo de aplicación con agua y jabón suficiente. El producto sobrante conservarlo en un envase original, manteniendo este bien cerrado y en un lugar bajo llave.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Maíz Sorgo (SL)	Confitillo (<i>Parthenium bipinnatifidum</i>) Verdolaguilla (<i>Kallstroemia rosei</i>) Quintonil (<i>Amaranthus palmeri</i>) Boton de oro (<i>Melampodium divaricatum</i>)	2.0-3.0	Realizar aplicaciones dirigidas a la maleza. Realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza y al cultivo. Volumen de aplicación 855-955 L de agua/ha

TIEMPO DE REENTRADA.

No entrar a los lugares tratados sin el equipo de protección adecuado antes de que hayan transcurrido 24 horas de la última aplicación.

() Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha; SL=Sin Limite

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Agite el envase antes de usar el producto. Para abrir el envase desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello inducción). Mezclar la cantidad necesaria con agua limpia en el tanque del equipo de aspersión. En aspersiones terrestres utilizar de 200 a 300 litros de agua/ha. Es esencial hacer la aspersión con precisión y cubrir totalmente la maleza. Asegúrate de que las boquillas estén en buenas condiciones lo mismo que el aguilón.

CONTRAINDICACIONES.

No se aplique cuando el viento sea muy fuerte (más de 8Km/h), para evitar la deriva, ni a temperaturas muy altas (más de 38 °C).

INCOMPATIBILIDAD.

No se mezcle.

MANEJO DE RESISTENCIA.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICION CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOxicaciones (ATOX), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

