



# Ficha

# Técnica

# FUNGICIDAS



## FUNGIAL 80 WDG

Fosetil-Al

Fungicida

Gránulos dispersables

Organofosforado

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO

RSCO-FUNG-0347-X0177-034-80.0

TITULAR DE REGISTRO

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

### COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

#### Ingrediente Activo.

**FOSETIL-AL/FOSETIL ALUMINIO:**

Tris(etil fosfonato) de Aluminio  
(Equivalente a 800 g de i.a./kg)

80.0

#### Ingredientes Inertes.

Aglutinante, dispersante, portador

20.0

**TOTAL**

100.00

#### MODO DE ACCIÓN.

**FUNGIAL 80 WDG**, es un producto formulado como gránulos dispersables a base de Fosetil-Al, que actúa como fungicida sistémico de acción preventiva y curativa.

REG\_FT\_049

Versión. V00

Fecha de elaboración. 04.NOV.2024

Página 1 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad\_tridente



Agroquímica  
**Tridente**



# Ficha

# Técnica

# FUNGICIDAS



## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado, completo, limpio y necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo: gorra de algodón o sombrero, camisa de manga larga, pantalones largos, delantal tipo industrial resistente a productos químicos, lentes de seguridad, mascarilla contra polvos y gases, guantes y botas de neopreno que se destinen exclusivamente para el manejo y aplicación de plaguicidas. Se recomienda utilizar un overol de algodón sobre la ropa, para evitar infiltración del producto al cuerpo. Haga la preparación y aplicación del producto a favor del viento. Al terminar las labores descontamine el equipo de aplicación, haciendo uso de guantes quítese el overol y colóquelo en un lugar ventilado. Báñese y póngase ropa limpia. La ropa y overol utilizados durante la aplicación deben lavarse por separado con agua y jabón. Una vez seca, almacenar la ropa y todo el equipo de protección limpio en el lugar de trabajo.

## CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

| CULTIVO  | PLAGA<br>Nombre común<br>(Nombre científico)                | DOSIS                | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piña (7) | Pudrición del cogollo<br>( <i>Phytophthora parasítica</i> ) | 200-250<br>g / 100 L | Aplicación vía foliar: Realizar cuatro aplicaciones asegurando una cobertura uniforme, a intervalos de 1 mes entre ellas, iniciando al momento de observarse los primeros síntomas de la enfermedad en el cultivo. |

(7) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

## TIEMPO DE REENTRADA.

12 horas

**FORMA DE ABRIR EL ENVASE:** Use el equipo de protección en buen estado y completo (gorra de algodón o sombrero, camisa de manga larga, pantalones largos, delantal tipo industrial resistente a productos químicos, lentes de seguridad, mascarilla contra polvos y gases, guantes y botas de neopreno). Corte cuidadosamente con tijeras la parte superior del sobre o costal, realice esta operación con cuidado para evitar el contacto e inhalación del producto.

## MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Pese el producto necesario de acuerdo al cultivo y dosis recomendada. En un recipiente con 5-10 L de agua limpia, vierta el producto ya pesado y agítelo. Llene a la mitad el tanque de aplicación con agua y agregue lentamente el contenido del recipiente sin dejar de agitar. Siga agregando agua y agitando hasta completar la capacidad del tanque y obtener una mezcla uniforme y sin grumos. Agitar previamente antes de cargar la aspersora.

## CONTRAINDICACIONES.

No aplicar el producto cuando exista amenaza de lluvia o esté lloviendo ya que puede existir lavado del producto. Aplicar preferentemente en ausencia de viento; no aplique cuando la velocidad del viento sea alta (mayor a 15 Km/h), a fin de evitar pérdida del producto o quemaduras físicas en follaje. Aplique en horas tempranas del día o al atardecer; no se aplique en horas de calor intenso.

## INCOMPATIBILIDAD.

FUNGIAL 80 WDG no deberá mezclarse con otros plaguicidas.

REG\_FT\_049

Versión. V00

Fecha de elaboración. 04.NOV.2024

Página 2 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad\_tridente



Agroquímica  
**Tridente**



# Ficha

# Técnica

# FUNGICIDAS



## MANEJO DE RESISTENCIA.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

**AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.**, GARANTIZA LA COMPOSICION CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

