



Ficha

Técnica

INSECTICIDAS



HORTIMEC

Abamectina (Avermectina)

Insecticida / Acaricida

Concentrado emulsionable

Lactona macrocíclica glicosilada

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO

RSCO-INAC-0174-356-009-002

TITULAR DE REGISTRO

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

Ingrediente Activo.

Abamectina (Avermectina):
Mezcla de avermectinas B1 conteniendo no más de 80% de
avermectina B1a y no menos de 20% de avermectina B1b
(Equivalente a 18 g de I.A./L a 20°C)

1.800

Ingredientes Inertes.

Solventes y Emulsificante

98.200

TOTAL

100.00

MODO DE ACCIÓN.

HORTIMEC es un producto formulado como concentrado emulsionable a base de Abamectina (Avermectina), que actúa como Insecticida y/o Acaricida, controla durante los estados larvales de los minadores de hoja. Inmoviliza las plagas poco después de la exposición, la mortalidad máxima se alcanza entre los 3 y 5 días. Puede ser utilizado para tratamientos preventivos y/o control de la plaga ya establecida.

REG_FT_051

Versión. V00

Fecha de elaboración. 06.NOV.2024

Página 1 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha Técnica

INSECTICIDAS



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use equipo de protección personal adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, y aplicación del producto (gorra, overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno). Evite derrames accidentales y en caso de tenerlos utilizar materiales como aserrín para absorción. No coma, beba o fume durante su uso. Después de un día de trabajo, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia. Lavar bien y por separado, con agua y jabón, la ropa utilizada en el trabajo y almacenar después de la jornada laboral en el lugar de trabajo.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

CULTIVO	PLAGA NOMBRE COMÚN (Nombre científico)	DOSIS	OBSERVACIONES
Calabacita (3) Melón (3) Pepino (3) Sandía (3)	Minador de la hoja (<i>Liriomyza sativae</i>)	80-100 mL/100L de agua	Aplicación al follaje. Aplicar tan pronto como aparezcan los adultos de minadores de hoja. Repita la aplicación al menos con intervalos de 7 días.
Chile (7) Jitomate (3) Papa (10) Crisantemo (SL)	Minador de la hoja (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)	80-100 mL/ 100 litros de agua	Usar las dosis mayores en infestaciones altas y cuando las plantas sean grandes y densas durante la época de crecimiento. Asegurar una cobertura total de las plantas.
Fresa (3)	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	80-100 mL/ 100 litros de agua	Aplique al follaje como tratamiento preventivo durante la etapa de crecimiento vegetativo de las plantas, o cuando se observen a simple vista 2 o más arañas rojas por hoja. Repetir la aplicación con intervalos de 7 días para mantener el control. Use las dosis mayores en infestaciones altas y cuando las plantas sean grandes y densas durante la época de crecimiento. Asegurar una cobertura total de las plantas.
Limón (7) Naranja (7) Toronja (7) Mandarina (7) Lima (7) Tangerino (7) Pomelo (7) Cidro (7)	Psílido asiático de los cítricos (<i>Diaphorina citri</i> Kuwayama)	400-600 mL/100L de agua	Realizar 3 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, iniciar las aplicaciones cuando se detecte la presencia de ninfas y adultos de la plaga. Use las dosis mayores en infestaciones altas y cuando las plantas sean grandes y densas durante la época de crecimiento. Asegurar una cobertura total de las plantas.

(I): Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

(SL): Sin Límite

TIEMPO DE REENTRADA.

24 horas

REG_FT_051

Versión. V00

Fecha de elaboración. 06.NOV.2024

Página 2 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha

Técnica

INSECTICIDAS



FORMA DE ABRIR EL ENVASE.

Tenga siempre limpio y puesto su equipo de seguridad (gorra, overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno). Desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación directa del producto.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Mezclar la dosis de **HORTIMEC** en la mitad de agua requerida para su aplicación, después agregar la cantidad de agua restante hasta completar los litros de agua necesarios para cubrir una hectárea. La mezcla que se aplicará debe de mantenerse en agitación para que se obtenga una mezcla uniforme. La aplicación debe ser dirigida y evitar que se desvíe la aspersión por arrastre de viento u otras causas. Aplicar con equipo adecuado con campanas, o bien, dirigida la aspersión sobre la maleza sin tocar el cultivo.

Aplicación terrestre: Equipo terrestre de mochila o tractor, mezcle la dosis de HORTIMEC en la cantidad necesaria de agua limpia para cubrir una hectárea. Evite que se desvíe la aspersión por arrastre del viento u otras causas

CONTRAINDICACIONES.

No aplicar en horas de calor intenso, ni cuando la velocidad del viento sea fuerte (más de 15 Km/hr) y tampoco si existe la alta probabilidad de lluvia próxima a fin de evitar el lavado del producto.

INCOMPATIBILIDAD.

Este producto no ha presentado problemas de incompatibilidad cuando se mezcla con agroquímicos autorizados para su uso en los cultivos aquí mencionados. Sin embargo, es recomendable realizar una premezcla para asegurar la compatibilidad física de los productos.

MANEJO DE RESISTENCIA.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICION CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

REG_FT_051

Versión. V00

Fecha de elaboración. 06.NOV.2024

Página 3 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente