



Ficha

Técnica

INSECTICIDAS



SALIVAZO 1%

Imidacloprid

Insecticida

Granulado

Cloronicotinilos.

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO

RSCO-INAC-0199-0380-005-001

TITULAR DE REGISTRO

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

Ingrediente Activo.

IMIDACLOPRID

(E)-1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamina

Equivalente a 10 g de I.A/Kg

1.00

Ingredientes Inertes.

Vehículo, material inerte y colorante

99.0

TOTAL

100.00

MODO DE ACCIÓN.

SALIVAZO 1%, es un producto granulado formulado a base de Imidacloprid, que actúa como Insecticida de forma sistémica, por contacto e ingestión.

REG_FT_058

Versión. V00

Fecha de elaboración. 15.NOV.2024

Página 1 de 2



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha

Técnica

INSECTICIDAS



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo, por ejemplo: gorra de algodón o sombrero, mascarilla completa de protección contra polvos y vapores tóxicos con filtro combinados, p.e. ABEK-P, overol de algodón, guantes y botas de neopreno. No coma, beba o fume durante las aplicaciones. Procure realizar la preparación de la mezcla siempre a favor del viento. Después de un día de trabajo descontamine el equipo de aplicación en el mismo campo tratado, el equipo de protección personal se debe lavar y almacenar en el lugar de trabajo. Cambie con frecuencia los filtros del respirador. Después de cada día de trabajo, báñese adecuadamente y póngase ropa limpia.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS Kg/ha	OBSERVACIONES
Caña de azúcar (1)	Mosca Pinta (<i>Aeneolamia postica</i>)	20	Cuando las primeras ninfas y/o adultos se observen iniciar el tratamiento. Realizar una aplicación a la base de la planta.

() INTERVALO DE SEGURIDAD: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA.

12 horas

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Por ser un insecticida en forma granulado, la aplicación deberá realizarse discretamente sobre el cultivo. Si la aplicación es vía terrestre dirigir la aplicación a la base de las plantas con equipo terrestre (aspersora de motor), ya que es fácilmente absorbido por vía radicular. Indicar aplicaciones cuando se detecten las primeras incidencias de ninfas y adultos de mosca pinta o salivazo.

CONTRAINDICACIONES.

No aplicar en horas de calor intenso (Temperaturas mayores de 35° C), ni cuando la velocidad del viento sea alta (más de 8 km/hora). La eficacia del producto puede disminuir si llueve inmediatamente después de la aplicación.

INCOMPATIBILIDAD.

Este producto no deberá mezclarse con ningún otro plaguicida para su aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICION CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (ATOX), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

REG_FT_058

Versión. V00

Fecha de elaboración. 15.NOV.2024

Página 2 de 2



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente