



Ficha

Técnica

INSECTICIDAS



FUMITECO 56

Fosfuro de aluminio

Fumigante

Pastillas

Fosforado

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO

RSCO-FUMI-0407-320-095-056

TITULAR DE REGISTRO

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

Ingrediente Activo.

FOSFURO DE ALUMINIO

Equivalente a 560 g de I.A./kg a 20°C

56.0

Ingredientes Inertes.

Diluyente bloqueador de la inflamación y protector de la humedad

44.0

TOTAL

100.00

MODO DE ACCIÓN.

FUMITECO 56 es un producto formulado como pastillas a base de FOSFURO DE ALUMINIO, que actúa como Fumigante para el control de plagas en granos almacenados de maíz en silos o a granel estibas de grano de maíz ensacado para el control del gorgojo del maíz.

REG_FT_067

Versión. V00

Fecha de elaboración. 17.ENE.2025

Página 1 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.**

El Fosforo de aluminio genera gas venenoso, únicamente debe ser utilizado por personas adultas debidamente capacitadas y familiarizadas con las medidas de precaución, que en todo momento deberán ser observadas. Siempre que se entre a un lugar fumigado, se deberá hacer en parejas y con mascarillas con canister. Todos los locales colindantes deberán mantenerse bien ventilados; no practicar jamás tratamientos en edificios habitados. Usar mascarilla contra gases y vapores tóxicos, gorra y overol de algodón, botas y guantes de polinitrilo, lentes de seguridad. Lavar con agua y jabón la ropa empleada para el trabajo, así como el equipo empleado para su aplicación

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

PRODUCTO	PLAGA Nombre común (Nombre científico)	DOSIS	OBSERVACIONES
Granos almacenados de maíz en silos o a granel	Gorgojo del maíz (<i>Sitophilus zeamais</i>)	2 – 6 pastillas/m ³	a) Agregar las pastillas o comprimidos a intervalos regulares durante el proceso de llenado. b) En el caso de que el grano esté almacenado, introducir las pastillas o comprimidos a éste mediante un zonda y hermetizar. c) En el caso de silos, usar de ser posible un distribuidor automático.
Estibas de grano de maíz ensacado y/o encostado		2 – 4 pastillas/m ³	Colocar las pastillas o comprimidos de FUMITECO 56 separadas unos de otros sobre cartones a modo de bandejas, alrededor o debajo de las estibas, dejando espacio amplio entre estos y la lona, con el fin de facilitar la generación del gas asegurando una perfecta hermeticidad entre los bordes de la lona y el suelo.

TIEMPO DE REENTRADA.

Después de 6 horas.

FORMA DE ABRIR EL ENVASE.

Tenga siempre limpio y puesto su equipo de seguridad. Desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar el contacto con el producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Al ser un producto en forma de pastillas se aplica de diversas maneras.

PRODUCTOS A GRANEL: En el momento del llenado del almacén o silo, emplee el distribuidor automático sobre la banda o gusano. Si el grano ya está almacenado, introduzca las pastillas con una sonda.

PRODUCTOS ENCOSTADOS, EN CAJAS O TAMBORES: Colocar las pastillas, sobre cartones, a manera de bandejas o en sobres permeables, a la humedad y bien distribuidas por el almacén, alrededor, sobre y debajo de las estibas; convenientemente distribuidas, cuidando de emplear la dosis indicada por m³ de espacio por fumigar.

ESPACIOS Y LOCALES VACÍOS: Colocar la cantidad necesaria de pastillas, sobre bandejas de cartón, bien distribuidas en toda el área por fumigar.





Ficha

Técnica

INSECTICIDAS



CONTRAINDICACIONES.

No fumigar cuando la temperatura sea inferior a 5 °C. No usar en presencia de agua o en riesgo de contacto con agua.

INCOMPATIBILIDAD.

No mezclar con productos que contengan agua.

MANEJO DE RESISTENCIA.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICION CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

