



# Ficha

# Técnica

# HERBICIDAS



## DIABLOZINA 500 SC

Atrazina

Herbicida

Suspensión concentrada

Triazinas

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO

RSCO-HEDE-0204-258-064-45

DISTRIBUIDO POR:

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

### COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

#### Ingrediente Activo.

##### Atrazina

(6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3-5-triazina-2,4-diamina  
(Equivalente a 500 g de i.a./l a 20°C

45.00

#### Ingredientes Inertes.

Emulsificante, antiespumante, anticongelante, espesante antiséptico, estabilizador, agua

55.00

**TOTAL**

100.00

#### MODO DE ACCIÓN.

**DIABLOZINA 500 SC** es un herbicida formulado como suspensión concentrada. Este herbicida es absorbido por las raíces y las hojas de la maleza de hoja ancha y angosta

REG\_FT\_DIS\_030

Versión. 00

Fecha de elaboración. 16.OCT.2024

Página 1 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad\_tridente



Agroquímica  
**Tridente**



# Ficha

# Técnica

# HERBICIDAS



## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Durante el uso y manejo de este producto, use equipo de protección personal adecuado incluyendo overol, lentes para químicos, guantes resistentes a químicos, botas de neopreno y mascarilla. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón. Realice la mezcla del producto en un lugar ventilado, lave con agua limpia y jabón la ropa contaminada antes de volver a usarla. Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante agua limpia y jabón. Deberá descontaminar el equipo de protección al terminar la jornada laboral y almacenar en el lugar de trabajo.

## CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

| CULTIVO               | MALEZAS                                                                                                                                                                                                                   | DOSIS (L/ha) | OBSERVACIONES                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Maíz<br>Sorgo<br>(SL) | Aceitilla ( <i>Bidens pilosa</i> )<br>Quelite ( <i>Amaranthus hybridus</i> )<br>Zacate cadillo ( <i>Cenchrus equinatus</i> )<br>Pata de gallo ( <i>Eleusine indica</i> )<br>Zacate de agua ( <i>Echinochloa colonum</i> ) | 2.0 – 4.0    | Realizar una aplicación en preemergencia a la maleza y al cultivo. |
|                       | Hierba golondrina ( <i>Euphorbia hirta</i> )                                                                                                                                                                              | 3.0 - 4.0    |                                                                    |

## TIEMPO DE REENTRADA.

12 horas

(**I**) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin límite

## MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Antes de abrir el envase agite el producto, posteriormente gire la tapa de rosca y retire el sello de seguridad. Para preparar el producto, vacíe la dosis recomendada de **DIABLOZINA 500 SC** en el tanque de mezclado o del equipo, conteniendo las  $\frac{3}{4}$  partes del volumen de agua requerido para lograr una buena cobertura, agite y posteriormente agregue el agua faltante. Es importante que exista suficiente agitación durante el mezclado y su aplicación para mantener uniforme la suspensión. En aspersiones terrestres con equipo convencional, utilice de 200 a 400 litros de agua por ha. Use el equipo de protección overol, lentes para químicos, guantes resistentes a químicos, botas de neopreno y mascarilla

Como la acción del producto depende de la humedad del suelo, es indispensable una lluvia o riego dentro de los 7 días posteriores a la aplicación.

En aplicación pre-emergente: aplique **DIABLOZINA 500 SC** en los días que sigue a la siembra, antes de que nazca la maleza y el cultivo. El suelo deberá estar bien mullido y húmedo. La maleza emerge, se forman las primeras hojas, se amarillean y mueren dentro de los 5 a 10 días posteriores a la aplicación.

## CONTRAINDICACIONES.

En regiones con rotación de cultivos, no aplique más de 3 L/ha de **DIABLOZINA 500 SC** para evitar residuos en el suelo. Los campos tratados con **DIABLOZINA 500 SC** no deben sembrarse con cultivos susceptibles hasta transcurridos de 4 a 6 meses. Si las lluvias son abundantes, 6 meses después puede sembrarse algodón, papa, haba y trigo. No deberá sembrarse alfalfa o donde se siembre cultivos asociados.

## INCOMPATIBILIDAD.

No se recomienda **DIABLOZINA 500 SC**, en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en el cultivo recomendado en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previo a la aplicación”





# Ficha Técnica

## HERBICIDAS



### MANEJO DE RESISTENCIA.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

