



Ficha Técnica

HERBICIDAS



KOA 80 WDG

diuron

Herbicida Agrícola

Gránulos dispersables en agua

Fenilurea

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO

RSCO-HEDE-0221-0515-0424-80

DISTRIBUIDO POR:

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% (p/p)
Ingrediente Activo.	
Diuron:	80.0
3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea (Equivalente a 800 g de i.a./Kg)	
Ingredientes Inertes.	
Surfactante, humectante, estabilizador, excipiente desintegrante, impurezas y compuestos relacionados	20.0
TOTAL	100.00

MODO DE ACCIÓN.

KOA 80 WDG es un producto formulado como Gránulos dispersables en agua a base de Diuron, que actúa como Herbicida agrícola remergente a la maleza y post-emergente al cultivo.

REG_FT_DIS_046

Versión. V00

Fecha de elaboración. 05.NOV.2024

Página 1 de 4



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha

Técnica

HERBICIDAS



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Durante las operaciones de formulación y manejo utilice ropa de protección adecuada, gorra y overol de algodón.
Anteojos de seguridad con protección hermética, mascarilla contra polvo y vapores tóxicos guantes y botas de neopreno.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (Kg/ha)	OBSERVACIONES
Vid (0)	Mostaza negra (<i>Brassica nigra</i>) Quesitos (<i>Malva parviflora</i>) Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Tomatillo falso (<i>Lepidium sordidum</i>) Bolsa de pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)	1.5 - 4.0	Realizar una aplicación en pre-emergencia a la maleza y post-emergencia al cultivo, volumen de aplicación 350-450 L de agua/ha.
Algodón (0)	Calabacilla (<i>Cucurbita digitata</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Chayotillo (<i>Sicyos angulatus</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium sp.</i>) Girasol (<i>Helianthus annuus</i>) Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>) Golondrina (<i>Euphorbia sp.</i>) Malva (<i>Malva parviflora</i>) Margarita silvestre (<i>Bidens sp.</i>) Meloncillo (<i>Cucurbita foetidissima</i>) Mostaza silvestre (<i>Brassica campestris</i>) Quelite o bledo (<i>Amaranthus spp.</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Tomatillo (<i>Physalis spp.</i>) Torito o abrojo (<i>Tribulus terrestris</i>) Trébol (<i>Melilotus indica</i>)	0.8-1.25	Realizar una aplicación en pre-emergencia a la maleza y post-emergencia al cultivo, volumen de aplicación 350-450 L de agua/ha.
Caña de azúcar (0)	Calabacilla (<i>Cucurbita digitata</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Chayotillo (<i>Sicyos angulatus</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium sp.</i>) Golondrina (<i>Euphorbia sp.</i>) Malva (<i>Malva parviflora</i>) Meloncillo (<i>Cucurbita foetidissima</i>) Mostaza silvestre (<i>Brassica campestris</i>) Quelite o bledo (<i>Amaranthus spp.</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Tomatillo (<i>Physalis spp.</i>) Torito o abrojo (<i>Tribulus terrestris</i>) Trébol (<i>Melilotus indica</i>) Gloria de la mañana (<i>Ipomoea sp.</i>) Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>) Zacate cedillo (<i>Cenchrus echinatus</i>) Cola de zorra (<i>Setaria geniculata</i>)	2.0-3.0	Realizar una aplicación en pre-emergencia a la maleza y post-emergencia al cultivo, volumen de aplicación 350-450 L de agua/ha.
Espárrago (planta establecida) (0)	Quelite o bledo (<i>Amaranthus spp.</i>)	1.5-4.0	Realizar una aplicación en pre-emergencia a la maleza y post-emergencia al cultivo, volumen de aplicación 350-450 L de agua/ha.

REG_FT_DIS_046

Versión. V00

Fecha de elaboración. 05.NOV.2024

Página 2 de 4



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha Técnica

HERBICIDAS



Espárrago (coronas recién plantadas) (0)	Quelite o bledo (<i>Amaranthus spp.</i>)	2.0-4.0	Realizar una aplicación en pre-emergencia a la maleza y post-emergencia al cultivo, volumen de aplicación 350-450 L de agua/ha.
Lima, Limonero, Naranja, Mandarino, Tangerino, Toronjo, (0)	Quelite o bledo (<i>Amaranthus spp.</i>)	1.5-4.0	Realizar una aplicación en pre-emergencia a la maleza y post-emergencia al cultivo, volumen de aplicación 350-450 L de agua/ha.
Maíz, Sorgo (0)	Quelite o bledo (<i>Amaranthus spp.</i>) Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>)	1.0-2.0	Realizar una aplicación en pre-emergencia a la maleza y post-emergencia al cultivo, volumen de aplicación 350-450 L de agua/ha.
Papa (0)	Quelite o bledo (<i>Amaranthus spp.</i>)	1.5-4.0	Realizar una aplicación en pre-emergencia a la maleza y post-emergencia al cultivo, volumen de aplicación 350-450 L de agua/ha.
Piña (0)	Quelite o bledo (<i>Amaranthus spp.</i>)	5.0	Realizar una aplicación en pre-emergencia a la maleza y post-emergencia al cultivo, volumen de aplicación 350-450 L de agua/ha.
Plátano (0)	Quelite o bledo (<i>Amaranthus spp.</i>)	1.5-4.0	Realizar una aplicación en pre-emergencia a la maleza y post-emergencia al cultivo, volumen de aplicación 350-450 L de agua/ha.

(I) Intervalo de seguridad en días: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL=Sin límite

TIEMPO DE REENTRADA.

12 horas

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Abra el envase de **KOA 80 WDG**, utilizando ropa de protección adecuada. Agregue la mitad de la cantidad requerida de agua al tanque, adicione la dosis completa del producto, agite y continúe la agitación mientras se agrega el resto del agua calculada en la calibración. Es importante continuar la agitación constante para mantener una solución uniforme.

Calibre su equipo de aplicación. Utilice el volumen de agua necesario para lograr una buena cobertura del área a tratar.

CONTRAINDICACIONES.

KOA 80 WDG, deberá aplicarse en condiciones climáticas favorables. No se aplique en horas de calor intenso, o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha de la presencia de lluvia en las horas inmediatas a la aplicación.

INCOMPATIBILIDAD.

KOA 80 WDG, no deberá mezclarse con ningún otro plaguicida para su aplicación.

REG_FT_DIS_046

Versión. V00

Fecha de elaboración. 05.NOV.2024

Página 3 de 4



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha Técnica

HERBICIDAS



MANEJO DE RESISTENCIA.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

