



Ficha Técnica

HERBICIDAS



POTRERO 101

2,4-D+Picloram

Herbicida Agrícola

Concentrado Soluble

Ácido picolínico / Fenóxidos

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO
RSCO-MEZC-1219-0669-375-26.07

DISTRIBUIDO POR:
AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% (p/p)
Ingrediente Activo.	
2,4-D: Ácido (2,4-diclorofenoxi) acético (Equivalente a 240 g de 2,4-D/L a 20°C)	20.58
PICLORAM: Ácido 4-amino-3,5,6-tricloropiridin -2-carboxílico (Equivalente a 64 g de ácido picloram/L a 20°C)	5.49
Ingredientes Inertes.	
Agente neutralizante y Disolvente	73.93
TOTAL	100.00

MODO DE ACCIÓN.

POTRERO 101 es un producto formulado como concentrado soluble a base de 2,4-D y Picloram, que actúa como Herbicida selectivo y sistémico contra la maleza.

REG_FT_DIS_051

Versión. V00

Fecha de elaboración. 15.NOV.2024

Página 1 de 2



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha

Técnica

HERBICIDAS



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

- Durante las operaciones de formulación y manejo utilice ropa de protección adecuada, gorra y overol de algodón.
- Anteojos de seguridad con protección hermética, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos y guantes y botas de neopreno.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

CULTIVO	MALEZAS Nombre común (Nombre científico)	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Pastizal Establecido en Potreros (30)	Dormilona (<i>Mimosa pudica</i>) Escobilla (<i>Sida acuta</i>) Mala mujer (<i>Cnidoscolus urens</i>) Malva (<i>Malva parviflora</i>) Aceitilla (<i>Bidens odorata</i>)	2.0 - 4.0	Realizar una aplicación en post emergencia a la maleza y al cultivo, volumen de aplicación 330 – 430 L de agua/ha

() Intervalo de Seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA.

12 horas

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Abra el envase de **POTRERO 101** utilizando ropa de protección adecuada. Agregue la mitad de la cantidad requerida de agua al tanque, adicione la dosis completa del producto, agite y continúe la agitación mientras se agrega el resto del agua calculada en la calibración. Es importante continuar la agitación constante para mantener una solución uniforme. Calibre su equipo de aplicación. Utilice el volumen de agua necesario para lograr una buena cobertura del área a tratar.

CONTRAINDICACIONES.

POTRERO 101 deberá aplicarse en condiciones climáticas favorables. No se aplique en horas de calor intenso, o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha de la presencia de lluvia en las horas inmediatas a la aplicación.

INCOMPATIBILIDAD.

POTRERO 101 no deberá mezclarse con ningún otro producto plaguicida para su aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

REG_FT_DIS_051

Versión. V00

Fecha de elaboración. 15.NOV.2024

Página 2 de 2



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente