



Ficha

Técnica

HERBICIDAS



SOYUZ 100 SL

Imazetapir

Herbicida

Concentrado soluble

Imidazolina

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO

RSCO-HEDE-0267-0732-375-9.72

DISTRIBUIDO POR:

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

Ingrediente Activo.

Imazetapir:

Ácido 5-etil-2-[(RS)-4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il]nicotínico
Equivalente a 100 g/L de i.a. a 20°C

9.72%

Ingredientes Inertes.

Agente neutralizante, Humectante y Diluyente

90.28%

TOTAL

100.00%

MODO DE ACCIÓN.

SOYUZ 100 SL, es un producto formulado como concentrado soluble a base de imazetapir, es un herbicida sistémico para el control de malezas ya emergidas y control para malezas que están por emerger.

REG_FT_DIS_053

Versión. V00

Fecha de elaboración. 20.NOV.2024

Página 1 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha

Técnica

HERBICIDAS



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

“Durante el uso y manejo de este producto, use equipo de protección personal adecuado incluyendo gorra impermeable, camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, lentes de seguridad transparente con protección hermética, o careta facial protectora, guantes y botas de neopreno. Realice la mezcla del producto en un lugar ventilado. Evite el contacto con la piel, boca y ojos, si esto sucede aplique los primeros auxilios descritos en esta etiqueta. Al término de la jornada laboral: lave ropa de trabajo con agua limpia y jabón, de forma separada de la ropa de uso común, descontamine el equipo de protección personal y el equipo de aplicación y almacénelos en el lugar de trabajo bajo llave. El producto sobrando después de la aplicación deberá mantenerlo en su envase original, bien cerrado y bajo llave en el lugar de trabajo.”

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS	OBSERVACIONES
Alfalfa (30)	Acetilla (<i>Bidens pilosa</i>) Campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>) Diente de león (<i>Taraxacum officinale</i>)	0.8 L/ha	Realizar una aplicación dirigida en post-emergencia a la maleza.
	Cola de ardilla/Hierba amargosa (<i>Parthenium hysterophorus</i>) Zacate sedoso o Triguillo (<i>Setaria sp.</i>)	1.2 L/ha	
Frijol Soya Cacahuete (Sin límite)	Acetilla (<i>Bidens pilosa</i>) Quelite (<i>Amaranthus hybridus</i>) Zacate pinto (<i>Echinochloa colonum</i>) Malva (<i>Malva parviflora</i>) Zacate cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>) Zacate johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Zacate conejo (<i>Digitaria ciliaris</i>) Mostacilla (<i>Sisymbrium irio</i>) Zacate cola de zorra (<i>Leptochloa filiformis</i>) Campanita (<i>Ipomoea purpurea</i>) Coquillo (<i>Cyperus rotundus</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Zacate pitillo (<i>Ixophorus unisetus</i>) Tomatillo (<i>Physalis angulata</i>) Quiebraplato (<i>Ipomoea purpurea</i>) Pasto moro (<i>Leptochloa filiformis</i>) Tapete (<i>Datura stramonium</i>) Lechosa (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate fresadilla (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Amaranto (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	0.5 – 1.0 L/ha	Realizar una aplicación foliar dirigida a la maleza en post-emergencia temprana a la maleza de 1 hasta 3 hojas. Volumen de aplicación sugerido 250 – 350 L de agua/ha.

(): Intervalo de seguridad

TIEMPO DE REENTRADA A CAMPOS TRATADOS: 48 horas.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Use el equipo de protección señalado en la sección PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. Rompa el sello y desenrosque la tapa evitando el contacto con la ropa y piel. Mida la cantidad de producto requerida para el tratamiento en una probeta de plástico y vacíe el producto en el contenedor con agua donde realizará la mezcla. Realice el triple lavado del envase. Cuando vacíe el contenido del producto evite hacerlo con viento. Agite el contenido ayudado de una madera o agitador destinado para tal fin, hasta que la mezcla este uniforme. Prepare sólo la cantidad de solución necesaria para la aplicación.

REG_FT_DIS_053

Versión. V00

Fecha de elaboración. 20.NOV.2024

Página 2 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha

Técnica

HERBICIDAS



Utilice equipo de aplicación en buenas condiciones. Las aplicaciones deben hacerse cuando la velocidad del viento favorezca la caída del producto sobre el objetivo.

CONTRAINDICACIONES.

Realice las aplicaciones en las primeras horas de la mañana o por la tarde, siempre a favor del viento, cuando haya viento mayor a 15 km/h no aplique este producto. No exceda las dosis recomendadas en la presente etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD.

SOYUZ 100 SL es incompatible con productos oxidantes.

MANEJO DE RESISTENCIA.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

RAINBOW AGRO SCIENCES, S.A. DE C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual y descripción química de esta etiqueta, siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las instrucciones de RAINBOW AGRO SCIENCES, S.A. DE C.V. y bajo condiciones normales de uso. Los compradores y/o usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier uso contrario a las instrucciones descritas en esta etiqueta.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (ATOX), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

