



# Ficha

# Técnica

# INSECTICIDAS



## CAPTOR 300

Proteína hidrolizada

Atrayente

Solución acuosa

Proteína hidrolizada

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO

RSCO-ATRA-0702-304-013-033

DISTRIBUIDO POR:

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

### COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

#### Ingrediente Activo.

**Proteína hidrolizada: Aminoácidos obtenidos de la hidrólisis de diferentes proteínas**  
(Equivalente a 360 g de I.A./L)

33.0

#### Ingredientes Inertes.

Solventes (agua) y conservador

67.0

**TOTAL**

**100.00**

### MODO DE ACCIÓN.

**CAPTOR 300**, es un producto formulado como solución acuosa a base de PROTEÍNA HIDROLIZADA, que actúa como atrayente alimenticio se usa para la detección y control de moscas de la fruta, a través del trampeo y mediante aspersiones terrestres y áreas en mezcla con agua.

REG\_FT\_DIS\_065

Versión. V00

Fecha de elaboración. 24.ENE.2025

Página 1 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad\_tridente



Agroquímica  
**Tridente**



# Ficha

# Técnica

# INSECTICIDAS



## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

**CAPTOR 300** no requiere de precauciones ni advertencia especiales para su uso, se deben adoptar las medidas precautorias indicadas del insecticida con el que se mezcle.

## MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

**Para el trampeo:** 250 de mezcla por trampa.

**Método para preparar el producto:** en un recipiente mezclar 10 mL de **CAPTOR 300**, 5 g de Borax pentahidratado, 12 mL de propilenglicol y 233 mL de agua. Poner el contenido de la mezcla en cada trampa y cambiar cada 7 días.

**En aspersiones terrestres:** aplicar 150-300 mL por árbol en la parte soleada en manchas circulares de la parte media a la parte alta de la copa. En hileras alternas.

**Método para preparar el producto:** en un recipiente mezclar 10 mL de insecticida generalmente Malation 500 y Malation 1000, 40 mL de **CAPTOR 300** y 950 mL de agua.

**En aspersiones aéreas:** aplicar 1 litro de mezcla por hectárea en franjas alternas.

**Método para preparar el producto:** En un recipiente mezcla 1 litro de Malation Ultra bajo volumen y 4 litros de **CAPTOR 300**.

## TIEMPO DE REENTRADA.

Seguir lo establecido en la etiqueta del insecticida con que se mezcle.

## FRECUENCIA DE APLICACIÓN.

Las aplicaciones tanto en aspersiones terrestres como en aspersiones aéreas se deben realizar cada 7 días. Intervalo entre la última aplicación y la recolección o cosecha del cultivo. Seguir lo establecido en la etiqueta del insecticida con que se mezcle.

## CONTRAINDICACIONES.

Ninguna.

## INCOMPATIBILIDAD.

La eficacia de **CAPTOR 300** puede ser afectada cuando se combina o se aplica sobre fungicidas cúpricos.

## MANEJO DE RESISTENCIA.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

REG\_FT\_DIS\_065

Versión. V00

Fecha de elaboración. 24.ENE.2025

Página 2 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad\_tridente



Agroquímica  
**Tridente**



Ficha

Técnica

INSECTICIDAS

