



# Ficha

# Técnica

# HERBICIDAS



## POTRERO D

2,4-D + Aminopiraldia

Herbida

Concentrado Soluble

Herbida fenoxiacético/ Compuesto de piridina.

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO  
RSCO-MEJC-HEDE-0222-0201U-X0084-375-30.31  
DISTRIBUIDO POR:  
AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

| COMPOSICIÓN PORCENTUAL                                                                                         | % (p/p)       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Ingredientes Activos.</b>                                                                                   |               |
| <b>2,4-D:</b> Ácido (2,4-diclorofenoxi) acético<br>(Equivalente a 320g/L de i.a. a 20°C)                       | 26.94         |
| <b>Aminopiraldia:</b> Ácido 4-amino-3,6-dicloropiridina-2-carboxílico<br>(Equivalente a 40 g/L de i.a. a 20°C) | 3.37          |
| <b>Ingredientes Inertes.</b>                                                                                   |               |
| Agente neutralizante, Estabilizante, Sinergista, Antiespumante y Solvente                                      | 69.69         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                   | <b>100.00</b> |

### MODO DE ACCIÓN.

POTRERO D es un producto formulado como concentrado soluble a base de 2,4-D y Aminopiraldia, que actúa como Herbida selectivo y sistémico contra la maleza.

REG\_FT\_DIS\_069

Versión. V00

Fecha de elaboración. 19.NOV.2025

Página 1 de 2



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad\_tridente



Agroquímica  
**Tridente**



# Ficha

# Técnica

# HERBICIDAS



## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

"Durante el uso y manejo de este producto, use equipo de protección personal adecuado incluyendo gorra impermeable, guantes y botas de neopreno, camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, mascarilla con filtro contra polvos y vapores y lentes de protección hermética lateral. Deberá descontaminar el equipo de protección al terminar la jornada laboral lavándolo con agua limpia y jabón de manera separada de la ropa de uso común, y almacenar junto con el equipo de trabajo en un área fresca y bajo llave".

## CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

| CULTIVO                                 | MALEZAS                                                                                                                                                                    | DOSIS                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Pastizales establecidos en potreros (0) | Hoja ceniza ( <i>Lagascea helianthifolia</i> )<br>Gigantón ( <i>Tithonia tubiformis</i> )<br>Dormilona ( <i>Mimosa pudica</i> )                                            | 0.75-1.25 L/100L de agua |
| OBSERVACIONES                           | Realiza una aplicación en postemergencia dirigida al follaje de la maleza cuando ésta tenga una altura menor a 20 cm; volumen de aplicación sugerido 464-564 L de agua/ha. |                          |

Tiempo de reentrada a campos tratados: 24 horas.

( ) Intervalo de Seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

## MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

"Durante el manejo y aplicación de este producto, siempre utilice su equipo de protección personal indicado en la sección PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. Para abrir el envase, quite la tapa de rosca y retire el sello de seguridad, evitando el contacto con la ropa, piel y ojos. Llene el tanque con agua a una tercera parte o a la mitad de su capacidad total. Agregue la cantidad necesaria de **POTRERO D** de acuerdo a las dosis indicadas en esta etiqueta, adicione el resto de agua y agite el contenido con ayuda de un utensilio de madera o agitador destinado para tal fin, hasta que la mezcla sea homogénea. Es importante mantener la agitación durante la aplicación".

## CONTRAINDICACIONES.

No aplicar cuando el cultivo se encuentre bajo estrés. No aplicar con vientos mayores de 8 km/h para evitar la deriva del producto hacia cultivos o plantas susceptibles. No mezclar, almacenar ni aplicar este producto en tanques de acero galvanizado, excepto de acero inoxidable. No se aplique en horas de calor intenso, o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha de la presencia de lluvia en las horas inmediatas a la aplicación.

## INCOMPATIBILIDAD.

No se recomienda **POTRERO D** en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos agroquímicos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

## MANEJO DE RESISTENCIA.

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

REG\_FT\_DIS\_069

Versión. V00

Fecha de elaboración. 19.NOV.2025

Página 2 de 2



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad\_tridente



Agroquímica  
**Tridente**