



Herbicidas



FICHA TÉCNICA

-MAIZURON 40 SC-



Familia o grupo.	Sulfonilureas
Tipo de formulación.	Suspensión concentrada
No. De Registro.	RSCO-HEDE-0274-X0015-064-4.21

COMPOSICIÓN PORCENTUAL		% (p/p)
Ingrediente Activo.		
Nicosulfuron: 2-[(4,6-dimetoxipirimidin-2-ilcarbamoil)-sulfamoil]-N,N-dimetilnicotinamida (Equivalente a 40 g/L a 20°C)		4.21
Ingredientes Inertes.		95.79
Agentes dispersantes, antiespumante, espesante y portador		
TOTAL		100.00

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Durante el manejo de este producto use el equipo de protección adecuado: overol de mangas largas, guantes impermeables, lentes de seguridad, botas, gorra y mascarilla provista de filtro. Lave con agua y jabón su ropa protectora contaminada, antes de volverla a usar. El producto sobrante se debe conservar en su envase original, manteniendo este perfectamente cerrado, y en un lugar fresco, seco y ventilado.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

MAIZURON 40 SC, es un producto sistémico del grupo de las sulfonilureas, selectivo de maíz, que se aplica en post emergencia y que controla la maleza que a continuación se indica.

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS	RECOMENDACIONES
Maíz (SL)	Zacate cola de zorra (<i>Leptochloa foliformis</i>) Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>) Quelite bleado (<i>Amaranthus hybridus</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	1.0-1.5 L/ha	Realice una aplicación en post emergencia al cultivo y post emergencia temprana a la maleza





Herbicidas



() **INTERVALO DE SEGURIDAD:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha (SL): Sin Límite
Periodo de reentrada al área tratada: Después de 24 horas de la aplicación del producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Abra el envase girando la tapa hasta romper el arillo de seguridad. Llenar el tanque de aplicación hasta 3/4 partes de su capacidad con agua. Agregar el producto a la dosis recomendada, realice el triple lavado del envase y agregue el agua de lavado al tanque; complete la capacidad sin dejar de agitar. La mezcla deberá aplicarse el mismo día. Debe aplicarse con suficiente cantidad de agua, según el tipo de aplicación, tipo de boquilla y tamaño de la maleza; no obstante, se recomienda un volumen de agua de 200 L/Ha.

CONTRAINDICACIONES.

Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de la mañana. No permita el acarreo de la aplicación del producto hacia cultivos susceptibles. No aplicar cuando existan vientos fuertes (mayor a 10 km/h). No aplicar en suelos con pH mayor de 7.5, no aplique en maíz dulce ni palomero

FITOTOXICIDAD

Este producto no es fitotóxico a la dosis y en el cultivo aquí recomendado

INCOMPATIBILIDAD.

Si se desea hacer alguna mezcla de tanque, deberá hacerse una prueba previa a fin de demostrar eficacia y asegurar que no haya efectos fitotóxicos. La mezcla deberá hacerse únicamente con productos registrados y autorizados en el cultivo indicado en esta etiqueta. No aplicar en maíz tratado con insecticidas organofosforados y piretroides sistémicos.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Durante el uso y manejo de este producto siempre utilice el equipo de protección personal reportado en la sección de "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO"

