



Ficha

Técnica

HERBICIDAS



DIABLOPLAX H375

Ametrina + 2,4-D Éster isobutílico

Herbicida

Concentrado emulsionable

Triazinas / alquilclorofenoxi.

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO
RSCO-MEZC-HEDE-1206-X0007-009-41.9

DISTRIBUIDO POR:
AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% (p/p)
Ingrediente Activo.	
AMETRINA: N2-etil-N4-isopropil-6-metiltio-1,3,5-triazina-2,4-diamina (Equivalente a 255 g de i.a./L a 20°C)	25.50
2,4-D éster isobutílico: Éster isobutílico del ácido(2,4-D-diclorofenoxi) acético. Con un contenido de ácido (2,4-D-diclorofenoxi) acético de 79.75% (Equivalente a 130.5 g de i.a./L a 20°C)	16.40
Ingredientes Inertes.	
Solvente	58.10
TOTAL	100.00

MODO DE ACCIÓN.

DIABLOPLAX H375 es un herbicida agrícola selectivo a base de ametrina y 2,4-D éster isobutílico en concentrado emulsionable, que se emplea para el control de maleza de hoja ancha y angosta. Penetra en la maleza a través del follaje y la raíz.

REG_FT_DIS_037

Versión. V00

Fecha de elaboración. 24.OCT.2024

Página 1 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha

Técnica

HERBICIDAS



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Durante el uso y manejo de este producto, use equipo de protección personal adecuado incluyendo overol y delantal industrial, goggles o lentes para químicos, guantes resistentes a químicos, botas de neopreno y mascarilla con respirador. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón y almacene en el lugar de trabajo después de la jornada laboral. Realice la mezcla del producto en un lugar ventilado, lave con agua limpia y jabón la ropa contaminada antes de volver a usarla. Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante agua limpia y jabón.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

CULTIVO	MALEZAS Nombre común (Nombre científico)	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Caña de azúcar (SL)	Zacate amargo (<i>Paspalum dilatatum</i>) Fresadilla (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Correhuela (<i>Ipomea purpurea</i>) Gordolobo (<i>Gnaphalium oxyphyllum</i>)	4.0 - 6.0	Aplicación en post-emergencia temprana a la maleza y al cultivo. Volumen de aplicación: 400 L/ha
	Hierba golondrina (<i>Euphorbia hirta</i>) Amargosa (<i>Parthenium hysterophorus</i>)	6.0	

TIEMPO DE REENTRADA.

12 horas

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin Límite

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Para abrir el envase, quite la tapa de rosca y retire el sello de seguridad. Para realizar la mezcla de aplicación, vierta la cantidad de producto requerida de acuerdo a las dosis aquí recomendadas, en un tanque con suficiente agua para tratar la superficie deseada asegurándose de lograr una buena cobertura de la maleza existente. En aplicación terrestre con aspersor manual o de tractor, aplicar un volumen de 200-400 L/ha de agua. El equipo que use deberá calibrarse y lavarse cuidadosamente con detergente o amonía para evitar daño en aplicaciones posteriores.

DIABLOPLAX H375 tiene efecto residual en el suelo. Se aplica en post-emergencia temprana cuando la maleza esta tierna y en activo crecimiento. Es importante que haya humedad en el suelo. Se recomienda utilizar un coadyuvante no iónico a dosis de 0.025%.

CONTRAINDICACIONES.

No aplicar con vientos mayores de 10 km/h para evitar la deriva del producto hacia cultivos o plantas susceptibles. No debe aplicarse cuando el cultivo de caña de azúcar se encuentre asociado con otros como chile, tomate o frijol, ya que es fitotóxico a estos.

INCOMPATIBILIDAD.

No se recomienda **DIABLOPLAX H375** en mezcla de tanque. Si se desea mezclar la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

REG_FT_DIS_037

Versión. V00

Fecha de elaboración. 24.OCT.2024

Página 2 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha

Técnica

HERBICIDAS



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

