



Ficha

Técnica

FUNGICIDAS



METALKIL CL

metalaxil + clorotalonil

Fungicida

Polvo humectable

Fenilamida. / Cloronitrilos /

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO
RSCO-MEZC-1311-307-002-081

DISTRIBUIDO POR:
AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

Ingrediente Activo.

METALAXIL: metil *N*-(metoxiacetil)-*N*-(2,6-xilil)-*DL*-alaninato

9.00

(Equivalente a 90 g de I.A./Kg)

CLOROTALONIL: Tetracloroisofталonitrilo

72.00

(Equivalente a 720 g de I.A./Kg)

Ingredientes Inertes.

Humectante, dispersante, antiespumante y diluyente.

19.00

TOTAL

100.00

MODO DE ACCIÓN.

METALKIL CL, es un producto formulado como polvo humectable a base de Metalaxil / Clorotalonil, que actúa como fungicida con acción sistemática y de contacto.

REG_FT_DIS_049

Versión. V00

Fecha de elaboración. 14.NOV.2024

Página 1 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha Técnica

FUNGICIDAS



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Evite el contacto con la piel y ojos. No inhale la niebla de este producto. Use mascarilla apropiada para productos tóxicos. Tenga ropa, botas y guantes de neopreno que se usen solamente en el trabajo y no se lleven puestos después de éste. Lava bien el equipo después de usarlo. Lava bien la ropa de trabajo y almacénala en el lugar de trabajo.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (Kg/ha)	OBSERVACIONES
Ajo Cebollín (14)	Mancha púrpura (<i>Alternaria porri</i>) Mildió (<i>Pseudoperonospora destructor</i>)	1.0 – 3.0	Aplicación al follaje.
Brócoli Col Coliflor Col de Bruselas Mostaza Colza Colinabo (7)	Mildió (<i>Peronospora parasítica</i>)	1.5 – 3.0	Aplicación al follaje.
Calabacita (5)	Mildió (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	1.0 – 3.0	Aplicación al follaje.
Calabaza Chayote Pepino Sandía (5)	Mildió (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	1.0 – 3.0	Aplicación al follaje.
Cebolla (14)	Mancha púrpura (<i>Alternaria porri</i>) Mildió (<i>Peronospora destructor</i>)	1.0 – 3.0	Aplicación al follaje.
Espárrago (21)	Tizón foliar (<i>Alternaria sp.</i>)	2.0 – 3.0	Realizar 3 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad, utilizar un coadyuvante a dosis recomendada en su etiqueta; volumen de aplicación 200-300 L de agua/ha
Jitomate Berenjena Tomate verde Pimiento morrón Chile (7)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	2.0 – 3.0	Aplicación al follaje.
Melón (5)	Mildió (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	1.0 – 3.0	Aplicación al follaje.
Papa (7)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	2.0 – 3.0	Aplicación al follaje.
Poro (14)	Mancha púrpura (<i>Alternaria porri</i>) Mildió (<i>Peronospora destructor</i>)	1.0 – 3.0	Aplicación al follaje.

() Intervalo de Seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL: Sin límite.

REG_FT_DIS_049

Versión. V00

Fecha de elaboración. 14.NOV.2024

Página 2 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha Técnica

FUNGICIDAS



TIEMPO DE REENTRADA.

24 horas después de la aplicación.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Abrir el producto con la ayuda de unas tijeras. En la aspersora de 200 L agregue agua hasta la mitad de su capacidad. Vierta lentamente en la aspersora la cantidad debidamente pesada del producto a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar, llene la aspersora con el agua necesaria. Aplique de inmediato. Cada vez que llene la aspersora, deberá agitar antes la mezcla preparada. Las aplicaciones deberán efectuarse usando de 200 a 300 L de agua/ha.

CONTRAINDICACIONES.

No aplicar en horas de calor intenso. No aplicar cuando la velocidad del viento sea superior a los 15 km/h.

INCOMPATIBILIDAD.

No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina. Cuando se desconozca la compatibilidad de alguna mezcla de uso agrícola, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación para evitar efectos fitotóxicos; ésta mezcla será con productos que tengan registro vigente y los cultivos aquí indicados.

MANEJO DE RESISTENCIA.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

