

FICHA TÉCNICA

CIRANO 20% CE TRIDENTE



NOMBRE COMERCIAL: CIRANO 20% CE TRIDENTE

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente activo	%p/p
Cipermetrina: (±) alfa-ciano-3-fenoxibencil(±)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)- 2,2 dimetil ciclopropano carboxilato (Equivalente a 200 g de i.a./L a 20°C)	21.50
Ingredientes inertes: Emulsificantes, solventes y compuestos relacionados	78.50
Total	100.00

FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Piretroide

REGISTRO SANITARIO COFEPRIS: RSCO-URB-INAC-111-348-009-21.5

TIPO DE FORMULACIÓN: Concentrado emulsionable

MODO DE ACCIÓN DE CIRANO 20% CE TRIDENTE:

CIRANO 20% CE TRIDENTE es un producto formulado como concentrado emulsionable a base de cipermetrina, que actúa como insecticida y/o acaricida no sistémico con acción por contacto y estomacal, afecta los canales de sodio (Na⁺) en la membrana nerviosa provocando una intensa actividad repetitiva (bloqueo de la transmisión del influjo nervioso).

USOS AUTORIZADOS:

Insecticida de uso urbano para uso exclusivo de aplicadores de plaguicidas en el control de moscas, mosquitos, avispas, cucarachas, grillo, pescadito de plata, chinches, pulgas, hormigas, arañas, alacrán y termita.

Para tratamiento en cuartos de basura, baños, drenajes, entradas, vestíbulos, oficinas, áreas de vestidores, cuartos de máquinas y almacenes.

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: <http://www.tridente.com.mx>

FICHA TÉCNICA

CIRANO 20% CE TRIDENTE



CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES:

Nombre común	Nombre científico	Dosis ml/L de agua	Indicaciones para aplicación	
Mosca domestica	<i>Musca domestica</i>	5-10 mL	Aspersión dirigida a los insectos voladores o residuales en paredes y techos. Especial 100 mL de emulsión para 200 m ³ . Residual 50 mL de emulsión por m ²	
Mosquito común	<i>Aedes aegypti, Culex spp.</i>			
Mosquito del paludismo	<i>Anopheles spp.</i>			
Mosca de los establos	<i>Stomoxys calcitrans</i>			
Avispas	<i>Vespula spp.</i>			
Cucaracha alemana	<i>Blatella germanica</i>			
Cucaracha americana	<i>Periplaneta americana</i>			
Cucaracha oriental	<i>Blatta orientalis</i>			
Grillo	<i>Acheta domestica</i>			
Pescadito de plata	<i>Lepisma saccharina</i>			Rociar la emulsión a razón de 1 litro para cada 200 m ² de superficie. Tratar escondijos, ranuras, agujeros y debajo de tarimas, tapetes y detrás de muebles.
Chinche hocicona	<i>Triatoma spp.</i>			
Chinche de la cama	<i>Cimex lectularius</i>			
Pulgas	<i>Xenopsylla cheopis, Ctenocephalides felis</i>			
Hormigas	<i>Monomorium pharaonis, Solenopsis xyloni</i>			
Araña viuda negra	<i>Latrodectus mactans</i>			
Araña	<i>Lycosa spp.</i>			
Alacrán	<i>Centruroides spp.</i>			
Termita subterránea	<i>Reticulitermes flavipes</i>	0.5 mL	Aplicar la emulsión inyectando alrededor de las estructuras de madera.	

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: <http://www.tridente.com.mx>



FICHA TÉCNICA

CIRANO 20% CE TRIDENTE

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Por el tiempo de persistencia del producto puede hacerse necesaria una nueva aplicación después de 30 días. Repetir la aplicación en caso de infestación.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: Esperar a que seque el producto asperjado, aproximadamente 30 minutos.

FORMA DE ABRIR EL ENVASE:

Teniendo puesto el Equipo de Protección Personal (EPP) desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, retirar totalmente la tapa y eliminar el sello de seguridad (sello de inducción), esto se puede realizar con la pestaña de la rosca, colocando la rosca sobre el sello con la parte lisa que tiene una pequeña pestaña en la orilla, girar y retirar después de haber roto dicho sello. Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación el producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR CIRANO 20% CE TRIDENTE:

CIRANO 20% CE TRIDENTE es un concentrado emulsionable que debe de diluirse con agua en las dosis recomendadas para su aplicación, asperjar bien paredes, techos, pisos, falsos plafones, debajo de equipos y mobiliario como alacenas y anaqueles. Dirigir la aspersion a grietas y hendiduras, a los espacios entre paredes, alrededor de las coladeras, a los marcos de las puertas, tuberías y ductos. Versatilidad en la aplicación: aspersion directa manual o motorizada o nebulización en frio o termo-nebulización. El producto puede utilizarse tanto en áreas interiores y exteriores por ejemplo, instalaciones, residenciales, comerciales e industriales tales como casas habitación, áreas ornamentales, tiendas y supermercados, almacenes, plantas industriales.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP):

Usar gorra y overol de algodón mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno.

CONTRAINDICACIONES:

No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: <http://www.tridente.com.mx>