



Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



CIRANO 20% CE TRIDENTE

Cipermetrina

Insecticida y/o Acaricida

Concentrado emulsionable

Piretroides

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO
RSCO-URB-INAC-111-348-009-21.5

TITULAR DEL REGISTRO
AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

Ingrediente Activo.

CIPERMETRINA

(±)-alfa-ciano-3-fenoxibencil(±)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato
Equivalente a 200 g de I.A/L a 20°C

21.50

Ingredientes Inertes.

Emulsificantes, solventes y compuestos relacionados.

78.5

TOTAL 100.00

MODO DE ACCIÓN.

CIRANO 20% CE TRIDENTE, es un producto formulado como concentrado emulsionable a base de Cipermetrina, que actúa como insecticida y/o acaricida no sistémico con acción por contacto y estomacal.

REG_FT_004

Versión. 00

Fecha de elaboración. 29.MAR.2024

Página 1 de 3





Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de utilizar el producto. Use el equipo de protección adecuado y completo. Usar gorra y overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno. Descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente y una solución alcalina como lejía.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

NOMBRE COMÚN	DOSIS ml/L DE AGUA	INDICACIONES PARA APLICACIÓN
Mosca doméstica <i>Musca domestica</i> Mosquito común <i>Aedes aegypti,</i> <i>Culex spp.</i> Mosquito del paludismo <i>Anopheles pp.</i> Mosca de establos <i>Stomoxys calcitrans</i>	5 a 10 ml	Aspersión dirigida a los insectos voladores, o residuales en paredes y techos. Esparcir 100 ml de emulsión para 200 m ³ . Residual 50 ml de emulsión por m ² .
Avispas <i>Vespula spp.</i> Cucaracha alemana <i>Blatella germanica</i> Cucaracha americana <i>Periplaneta americana</i> Cucaracha oriental <i>Blatta orientalis</i> Grillo <i>Acheta domestica</i> Pescadito de plata <i>Lepisma saccharina</i> Chinche hocicona <i>Triatoma spp.</i> Chinche de cama <i>Cimex lectularius</i> Pulgas <i>Xenopsylla cheopis,</i> <i>Ctenocephalides feliz</i> Hormigas <i>Monomorium pharaonis,</i> <i>Solenopsis xiloni</i> Araña viuda negra <i>Latrodectus mactans</i> Araña <i>Lycosa spp.</i> Alacrán <i>Centruroides spp.</i>	5 a 10 ml	Rociar la emulsión a razón de 1 litro para cada 200 m ² de superficie. Tratar escondrijos, ranuras, agujeros y debajo de tarimas, tapetes y detrás de muebles.
Termita subterránea <i>Reticulitermes flavipes</i>	0.5 ml	Aplicar la emulsión inyectando alrededor de las estructuras de madera.





Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



TIEMPO DE REENTRADA.

Esperar a que seque el producto asperjado, aproximadamente 30 minutos.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN.

Por el tiempo de persistencia del producto, puede hacerse necesaria una nueva aplicación después de 30 días. Repetir la aplicación en caso de infestación.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

CIRANO 20% CE TRIDENTE, es un concentrado emulsionable que debe diluirse con agua en las dosis recomendadas para su aplicación, asperjar bien paredes, techos, pisos, falsos plafones, debajo de equipos y mobiliario como alacenas y anaqueles. Dirigir la aspersión a grietas y hendiduras, a los espacios entre paredes, alrededor de las coladeras, a los marcos de las puertas, tuberías y ductos.

VERSATILIDAD EN LA APLICACIÓN.

Aspersión directa manual o motorizada o nebulización en frío o termo-nebulización. El producto puede utilizarse tanto en áreas interiores y exteriores, por ejemplo, instalaciones, residenciales, comerciales e industriales, tales como casas habitación, áreas ornamentales, tiendas y supermercados, almacenes plantas industriales.

CONTRAINDICACIONES.

No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.

MANEJO DE RESISTENCIA.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICION CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOxicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

REG_FT_004

Versión. 00

Fecha de elaboración. 29.MAR.2024

Página 3 de 3

