



Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



RESIFUM "U" TRIDENTE

Cipermetrina + diclorvos

Insecticida

Concentrado Emulsionable

Organofosforado + piretroide

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO

RSCO-URB-MEZC-1133-309-009-24.5

TITULAR DEL REGISTRO

AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% (p/p)
Ingrediente Activo.	
Cipermetrina	
(±)-α-ciano-3-fenoxibencil(±)-cis, trans-3- (2,2 diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato (Equivalente a 46.7 g de i.a./L a 20°C)	4.50
Diclorvos	
2,2 diclorovinil dimetil fosfato (Equivalente a 207.5 g de i.a./L a 20°C)	20.00
Ingredientes Inertes.	
Solvente y emulsificantes	75.50
TOTAL	100.00

RESIFUM "U" TRIDENTE es un insecticida urbano para uso exclusivo de aplicadores de plaguicidas.

REG_FT_024

Versión. 00

Fecha de elaboración. 11.SEP.2024

Página 1 de 2





Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS
Araña capulina	(<i>Latrodectus mactans</i>)	5.0-10.0 ml en un litro de agua
Hormiga	(<i>Solenopsis geminata</i> , <i>Atta</i> spp.)	
Cucaracha	(<i>Piriplaneta</i> sp)	
Piojo harinoso	(<i>Pseudococcus</i> spp)	
Cochinilla de humedad	(<i>Trichoniscus</i> spp.)	
Alacrán	(<i>Centruroides</i> spp.)	

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: Se puede estar en el área tratada después de transcurridos 15 minutos después de ser ventilada.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Las aplicaciones pueden repetirse en un periodo de hasta 7 días hasta que la plaga haya sido controlada.

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Teniendo puesto el equipo de seguridad indicado, desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior (cuando el envase presente este sello exterior), retirar totalmente la tapa y eliminar el sello de seguridad interior (sello de inducción). Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación del producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Añadir la mitad (1/2 litro) de agua limpia al depósito del aspersor o rociador, añadir la cantidad necesaria del producto en el depósito del aspersor, cerrar el depósito del aspersor, agitar el aspersor para mezclar la emulsión, colocar el tanque a la presión recomendada por el fabricante, aplicar el insecticida de acuerdo a la tabla de recomendaciones indicadas anteriormente. Antes de aplicar se debe limpiar el área de zonas de acceso de las plagas. Si existen problemas de reinvasión, habrá que aplicar tratamientos repetidos. No aplicar directamente a los productos alimenticios ni tampoco a las superficies en las cuales los alimentos se almacenan, preparan o comen.

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICION CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

