



Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



TERMITRID

fipronil

Insecticida

Concentrado emulsionable

Fenilpirazoles

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO
RSCO-URB-INAC-0101A-X0002-009-2.60

TITULAR DEL REGISTRO
AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL		% (p/p)
Ingrediente Activo.		
Fipronil		
5-amino-1-(2,6-dicloro- α , α , α -trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometilsulfinilpirazol-3-carbonitrilo		2.60
Equivalente a 25 g de I.A/L a 20°C		
Ingredientes Inertes.		
Disolvente y emulsificantes		97.40
TOTAL		100.00

MODO DE ACCIÓN.

TERMITRID, es un producto formulado como concentrado emulsionable a base de FIPRONIL, que actúa como Insecticida que posee un prolongado efecto residual.





Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

- Los aplicadores y personas que manejan el producto deben usar el equipo de protección adecuado necesario para realizar con seguridad las actividades de manejo, preparación, mezclado, aplicación del producto, carga y lavado de los equipos de aplicación.
- Usar overol de mangas largas, botas, guantes, lentes de seguridad y mascarilla.
- Tener cuidado al abrir el envase para evitar derrames o salpicaduras.
- Lavar el equipo de protección y el equipo de aplicación, con detergente u una solución alcalina.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

NOMBRE COMÚN	(NOMBRE CIENTÍFICO)	DOSIS Y MÉTODO DE APLICACIÓN OBSERVACIONES
Termitas subterráneas	<i>Reticulitermes</i> spp <i>Zootermopsis</i> spp <i>Heterotermes</i> spp <i>Coptotermes</i> spp	Preparación de la emulsión: Para aplicar TERMITRID se debe preparar una emulsión al 2% ó 4% de producto formulado, para lo cual diluya 2 ó 4 litros en 100 L de agua, respectivamente. En situaciones normales de control de termitas subterráneas use una emulsión al 2%; en infestaciones severas use una emulsión al 4%. Volumen de aplicación y concentración de la emulsión: Se recomienda aplicar los volúmenes de emulsión especificados en esta etiqueta siempre y cuando sea posible. Cuando las condiciones del suelo no acepten el volumen estándar de emulsión, duplique la concentración de la emulsión y aplique la mitad del volumen. Por ejemplo: si no es posible aplicar 15 litros de emulsión al 2% por cada 3 metros lineales por 30 cm de profundidad, aplique 7.5 L de emulsión al 4% por cada 3 metros lineales por 30 cm de profundidad. Tratamiento en pre-construcción: consiste en establecer una barrera horizontal y vertical de insecticida entre el suelo y la edificación, y debe efectuarse durante la etapa inicial de construcción hasta inmediatamente antes de colocar la losa. Haga este tratamiento a la dosis de 4L de emulsión al 2% ó 4% de producto formulado por metro cuadrado, según la infestación de termitas. Si el relleno anterior a la losa es grava u otro material grueso, aplique 6L de emulsión por metro cuadrado, a fin de que la emulsión llegue hasta el suelo que se encuentra debajo del relleno. Procure hacer la aplicación cuando el suelo este seco. Haga la aplicación con baja presión (menos de 50 libras por pulgada cuadrada), empleando una boquilla de orificio grande y asperjando la emulsión uniformemente sobre toda el área
Termitas de la madera seca	<i>Marginitermes hubbardi</i> <i>Cryptotermes</i> spp <i>Kaloterme</i> s spp	
Termitas de nidos acartonados	<i>Nasutitermes</i> spp	





Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



		a tratar. Si la losa no va a ser colada el mismo día del tratamiento, cubra el suelo tratado con un material impermeable tal como una lona de polietileno. También, establezca una barrera vertical en las instalaciones de agua y drenaje, tubería de gas, líneas eléctricas, etc. aplicando una dosis de 15 L de emulsión al 2% ó 4% por cada 3 metros lineales por 30 cm de profundidad. Tanto esta aplicación como el tratamiento del suelo anterior a la losa deben efectuarse inmediatamente antes de cubrir el área con la losa. Tratamiento en post-construcción: Para tratar el suelo que está junto a la sedimentación, es necesario perforar la losa e inyectar el insecticida en lugar de asperjarlo. Aplique en inyección 15 litros de emulsión al 2% ó 4% de producto formulado por cada 3 metros lineales por 30 cm de profundidad a lo largo del perímetro interior de los cimientos. Las perforaciones deben hacerse lo suficientemente cercanas entre sí (aproximadamente 30 cm), de tal manera que permitan la formación de una barrera química continua. Haga la aplicación con baja presión. Selle las perforaciones después de la inyección. Previo al tratamiento localice las instalaciones de agua y drenaje, tubería de gas, líneas eléctricas, etc. debe tenerse especial cuidado para evitar perforar o contaminar estas instalaciones.
Cucarachas Alemana De bandas cafés Café Oriental Americana	<i>Blatella germanica</i> <i>Supellectilium</i> <i>Periplaneta fulginosa</i> <i>Blatta orientalis</i> <i>Periplaneta americana</i>	Aplique una dosis de 10 mL/L de agua ó 20 mL/L de agua dependiendo de la población de plaga como un rocío grueso localizado de baja presión en grietas y hendiduras donde estas plagas habitan comúnmente o suelen infestar. También puede aplicarse en exteriores de coladeras. Para el caso del control de las hormigas se puede aplicar directamente en los nidos. Debido a que la dosis se indica en mL de producto formulado por L de agua, la cantidad de agua a utilizar dependerá de la superficie a tratar, en aplicaciones totales un litro de mezcla es para 15 a 20 metros cuadrados.
Hormigas Doméstica Carpintera Cosechadoras De fuego Argentina Faraona De cabeza grande Del pavimento Pequeña hormiga del fuego	<i>Tapinoma</i> spp. <i>Camponotus</i> spp. <i>Pogonomirmex</i> sp. <i>Solenopsis</i> spp. <i>Iridomyrmex humilis</i> <i>Monomorium pharaonis</i> <i>Pheidole megacephala</i> <i>Tetramorium</i> sp. <i>Wasmania auropunctata</i>	
Moscas	<i>Musca domestica</i> . <i>Fannia</i> spp. <i>Drosophilla</i> spp.	
Mosquitos	<i>Culex</i> spp. <i>Aedes</i> spp.	





Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



	<i>Anopheles</i> spp.	
Pulgas	<i>Xenopsylla</i> spp. <i>Ctenocephalides</i> spp.	
Chinches	<i>Triatoma</i> spp. <i>Rhodnius prolixus</i>	
Chinche de cama	<i>Cimex</i> spp.	
Pescadito de plata	<i>Lepisma</i> spp.	
Grillo	<i>Acheta domesticus</i>	
Cochinillas	<i>Isopoda</i>	
Tijerilla	<i>Forficula auricularia</i>	
Alacranes	<i>Centruroide</i> spp.	
Arañas	<i>Latrodectus mactans</i> <i>Loxosceles</i> spp.	
Ciempiés	<i>Quilópodos</i> <i>Diplópodos</i>	
Gorgojos	<i>Tribolium castaneum</i> <i>Sitophilus oryzae</i> <i>Trogoderma granarium</i> <i>Tenebroides</i> sp.	
Garrapatas	<i>Ixodidae</i>	
Avispas	<i>Vespula</i> spp. <i>Vespa</i> spp.	

TIEMPO DE REENTRADA.

2 horas o inmediatamente después que haya secado.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN.

El producto puede aplicarse a un intervalo de 3 a 4 semanas entre las aplicaciones.

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Agite el envase antes de usar el producto, utilice el equipo de protección personal adecuado. Para abrir el envase desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación directa del producto

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para preparar el producto.

Las mezclas deben de hacerse de la siguiente manera:

- 1) Vacíe el agua en el tanque hasta $\frac{3}{4}$ partes de la requerida.
- 2) Mida la cantidad de **TERMITRID** necesario.
- 3) Añada **TERMITRID** al tanque y llene con el resto de agua.
- 4) Cierre el aspersor y agite para conseguir una suspensión apropiada. Si se interrumpe momentáneamente el tratamiento, vuelva agitar el aspersor antes de volver a usarlo.

REG_FT_064

Versión. V00

Fecha de elaboración. 23.DIC.2024

Página 4 de 5



Tridente
LINEA URBANA

Fórmula Integral para un Trabajo Profesional



Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



CONTRAINDICACIONES.

No aplique **TERMITRID** durante la preparación de alimentos o manipulación de forrajes.

INCOMPATIBILIDAD.

TERMITRID debe aplicarse solo, no se recomienda su uso en mezcla con otros plaguicidas.

MANEJO DE RESISTENCIA.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICION CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

