



Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



CIRANO 4% PS

Cipermetrina

Insecticida y/o Acaricida

Polvo seco

Piretroide

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO
RSCO-URB-INAC-0111-X0094-454-4.0

TITULAR DEL REGISTRO
AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente Activo.

CIPERMETRINA:

(RS)- α -ciano-3-fenoxibencil (1RS, 3RS; 1RS, 3SR)-3 -(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato
(Equivalente a 40 g de I.A./Kg)

Ingredientes Inertes.

Portadores, Disolventes y Fragancia

%
(p/p)

4.00

96.00

TOTAL 100.00

MODO DE ACCIÓN.

CIRANO 4% PS, es un producto formulado como polvo seco a base de CIPERMETRINA, este producto es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión. Su aplicación puede ser en interiores y exteriores; se puede utilizar en casas, edificios, oficinas, hospitales, escuelas, hotelería, supermercados, restaurantes, áreas verdes, jardines, industria alimentaria (establecimientos dedicados a la elaboración, procesamiento y almacén de alimentos), transportes, perreras, almacenes, bodegas y plantas industriales.

REG_FT_071

Versión. V00

Fecha de elaboración. 06.MAY.2025

Página 1 de 4





Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Durante el uso y manejo del producto: Siempre utilice equipo de protección personal adecuado, es decir: delantal o mandil, overol, guantes resistentes a sustancias químicas, mascarilla con filtro para polvos, lentes de seguridad y zapatos de seguridad, así como gorra de algodón. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal y/o la ropa contaminada, lávelos con agua limpia y jabón, seque al sol, guárdelos de manera separada a la ropa de uso común y bajo llave en un lugar fresco. Ocupe todo el producto el día de la aplicación, evitando así guardar sobrantes en recipientes no diseñados para este producto. Antes y después de utilizar el producto lávese cuidadosamente las manos.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

CIRANO 4% PS se recomienda para el control de las plagas abajo indicadas:

PLAGAS Nombre común Nombre científico	Dosis	Observaciones
<ul style="list-style-type: none"> Cucarachas (<i>Blattella germanica</i>) (<i>Periplaneta americana</i>) (<i>Blatta orientalis</i>) (<i>Supella longipalpa</i>) 	3Kg / 100m ²	Aplice de manera perimetral en interiores, en las coladeras, fregaderos, grietas y hendiduras y en los lugares donde las cucarachas normalmente transitan o se refugian.
<ul style="list-style-type: none"> Mosca (<i>Musca domestica</i>) (<i>Drosophila melanogaster</i>) (<i>Fannia canicularis</i>) (<i>Sarcophaga haemorrhoidalis</i>) (<i>Calliphora vicina</i>) (<i>Calliphora vomitoria</i>) (<i>Lucilia sericata</i>) 	3Kg / 100m ²	Aplicar en lugares escondidos, grietas en paredes, hendiduras, detrás de muebles sobre todo si son de madera, o en lugares donde se sospeche que sean refugios para la plaga.
<ul style="list-style-type: none"> Mosquitos (<i>Aedes aegypti</i>) (<i>Aedes albopictus</i>) (<i>Anopheles albimanus</i>) (<i>Anopheles quadrimaculatus</i>) (<i>Anopheles pseudopunctipennis</i>) (<i>Anopheles vestitipennis</i>) (<i>Anopheles aztecus</i>) (<i>Culex quinquefasciatus</i>) (<i>Culex tarsalis</i>) 	3Kg / 100m ²	
<ul style="list-style-type: none"> Pulgas (<i>Ctenocephalides felis</i>) (<i>Pulex irritans</i>) (<i>Ctenocephalides canis</i>) (<i>Xenopsylla cheopis</i>) 	3Kg / 100m ²	Aplicar en áreas y lugares frecuentados por los perros y gatos.





Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



<ul style="list-style-type: none"> Arañas (<i>Latrodectus mactans</i>) (<i>Latrodectus hesperus</i>) (<i>Latrodectus geometricus</i>) (<i>Loxosceles reclusa</i>) 	3Kg / 100m ²	Aplicar en lugares escondidos, grietas en paredes, hendiduras, detrás de muebles sobre todo si son de madera, o en lugares donde se sospeche que sean refugios para la plaga.
<ul style="list-style-type: none"> Jején (<i>Lutzomyia olmeca olmeca</i>) (<i>Lutzomyia shannoni</i>) (<i>Lutzomyia cruciata</i>) (<i>Lutzomyia diabolica</i>) 	3Kg / 100m ²	
<ul style="list-style-type: none"> Chinche (<i>Cimex lectularius</i>) (<i>Triatoma barberi</i>) (<i>Triatoma infestans</i>) (<i>Triatoma longipennis</i>) (<i>Triatoma pallidipennis</i>) (<i>Triatoma dimidiata</i>) 	3Kg / 100m ²	
<ul style="list-style-type: none"> Grillos (<i>Acheta domesticus</i>) 	3Kg / 100m ²	
<ul style="list-style-type: none"> Hormigas (<i>Monomorium pharaonis</i>) (<i>Solenopsis invicta</i>) (<i>Tetramorium caespitum</i>) (<i>Camponotus atriceps</i>) (<i>Tapinoma sessile</i>) (<i>Atta mexicana</i>) 	3Kg / 100m ²	

TIEMPO DE REENTRADA.

Después de transcurridos 30 minutos de la aplicación del producto.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN.

Antes de volver a aplicar el producto es necesario verificar las áreas tratadas para confirmar la existencia de una nueva infestación. En caso de problemas de reinfestación, se recomienda realizar tratamientos repetidos, hasta conseguir disminuir la presencia de la plaga. En caso de no infestación, se recomienda aplicar el producto de manera preventiva.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Antes de manipular el producto deberá usar el equipo de protección adecuado y necesario para realizar con precaución las operaciones de manejo, es decir: Delantal o mandil, overol, guantes resistentes a sustancias químicas, mascarilla con filtro para polvos, lentes de seguridad y zapatos de seguridad, así como gorra de algodón.

Corte cuidadosamente con tijeras la parte superior del sobre, realice esta operación con mucha precaución para evitar el contacto e inhalación del producto. Este producto es un polvo de aplicación directa por lo que, se debe usar la cantidad recomendada de acuerdo al cuadro de dosis – plaga, con ayuda de un aplicador de polvo o de un espolvoreador manual.





Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



Cucarachas. Se recomienda su aplicación en esquinas de alacenas y gavetas, pliegues y uniones de mobiliario, detrás de estufa y refrigerador, así como en canaletas, ductos y cajas eléctricas.

Arañas. Aplique en perímetro exterior, especialmente alrededor de puertas y ventanas, también alrededor de macetas y detrás de muebles de jardines y exteriores. En interiores aplique en las uniones de paredes y pisos, atrás de muebles y cuadros, así como en zoclos.

Hormigas. En exteriores, además de perímetros dirija la aplicación a los hormigueros y a lo largo de los senderos de la plaga. Inspeccione todos los posibles accesos como huecos en paredes, resquicios de puertas y ventanas, y dirija allí la aplicación.

Pulgas. Aplique en todas las orillas de las paredes, especialmente en los rincones, así como en zoclos y alrededor de las patas de todo el mobiliario. En presencia de alfombra, aplicar en el perímetro.

Chinchés. Retirar el colchón y aplicar en todas las uniones de la base de la cama, sobre todo si es de madera. Revisar por detrás de la cabecera y aplicar en esquinas y uniones, asimismo aplicar detrás de cuadros y zoclos.

Mantenga a las personas y mascotas fuera del área durante la aplicación del producto y no aplique directamente en fuentes de agua, a los productos alimenticios, ni en las superficies en las que se almacenen, preparen o ingieran alimentos. Deje que el producto actúe en el tiempo señalado y antes de volver a entrar a la zona o lugar tratado asegúrese de tener una buena ventilación.

CONTRAINDICACIONES.

Evite su uso en lugares con humedad excesiva. Ya que el producto se puede aglutinar, disminuyendo su eficacia. Si aplica en sitios como contactos y cajas eléctricas, así como tableros, canaletas y ductos, asegúrese de hacerlo con el equipo adecuado para evitar posibles descargas.

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOxicaciones (ATOX), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

